QL
428.5
I5L62
1914
MOLL

SMITHSONIAN
LIBRARIES

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES

Zur Molluskenfauna von Java und Celebes.

Von

Dr. *M. Leschke.*

Division of Mollusks
Sectional Library

Mit einer Tafel.

Aus „Mitteilungen aus dem Naturhistorischen Museum". XXXI.
(2. Beiheft zum Jahrbuch der Hamburgischen Wissenschaftlichen Anstalten. XXXI.)

Hamburg 1914.
Kommissionsverlag von Lucas Gräfe & Sillem.



420.5
I5L62
1914
Moll.

Zur Molluskenfauna von Java und Celebes.

Von

Dr. *M. Leschke.*

Division of Mollusks
Sectional Library

Mit einer Tafel.

U.S. NATIONAL MUSEUM
DALL COLLECTION
DIVISION OF MOLLUSKS

Aus „Mitteilungen aus dem Naturhistorischen Museum". XXXI.
(2. Beiheft zum Jahrbuch der Hamburgischen Wissenschaftlichen Anstalten. XXXI.)

SMITHSONIAN
OCT 2 8 1963
LIBRARIES

Hamburg 1914.
Kommissionsverlag von Lucas Gräfe & Sillem.

U.S. NATIONAL MUSEUM
DALL COLLECTION
DIVISION OF MOLLUSKS

I. Java.

Die nachfolgenden Seiten enthalten die Bestimmungen der von Herrn Prof. KRAEPELIN während seines Aufenthalts in Java im Frühjahr 1904 gesammelten Land- und Süßwasserschnecken, mit Ausnahme der Nacktschnecken, die sich bei Prof. SIMROTH zur Bearbeitung befinden. Ich erlaube mir, diese kleine Arbeit meinem hochverehrten Chef zu seinem 25jährigen Amtsjubiläum als geringes Zeichen meiner Dankbarkeit zu widmen. Die vorliegenden Mollusken sind in der Umgebung von Buitenzorg und Tjibodas gesammelt worden. Obwohl also aus einer verhältnismäßig gut bekannten Gegend stammend, bieten sie doch, außer einigen neuen Spezies, eine Reihe wertvoller Ergänzungen unserer bisherigen Kenntnisse. Besonders war es mir möglich, einige der von v. MOELLENDORFF nur kurz beschriebenen Arten aus FRUHSTORFERs Ausbeute genauer zu behandeln. In zoogeographischer Beziehung schließen sich die gewonnenen Resultate gut an das bisher Bekannte an. Da die Land- und Süßwasserfauna Javas seit längerer Zeit nicht zusammengefaßt ist, habe ich am Schlusse ein Verzeichnis aller bisher bekannt gewordenen Arten aus Java angefügt mit Angabe der Literatur, soweit sie sich auf Java bezieht und aller bisher veröffentlichten javanischen Fundorte.

Besprechung der einzelnen Arten.

Helicarion adolfi, Boettger.

1890. *Helicarion adolfi*, BOETTGER: Ber. Senckenb. Naturf. Ges. p. 138, Taf. 5, Fig. 1.
1912. „ „ SCHEPMAN: Proc. mal. Soc. London Bd. X, p. 231.

Tjompea, 11. III. 1904.

3 Stück ausgewachsen; 1 juv.

Diam. maj.	9	mm;	min.	7,6;	alt.	6,2.	Windungen	4.
„ „	9,2	„	„	7,5;	„	6,2.	„	4.
„ „	9,2	„	„	7,8;	„	6,4.	„	4.

Depok, 9. III. 1904.

1 Stück juv.

Tjibodas, 25. bis 28. III. 1904.

1 Stück ausgewachsen; 3 juv.

Diam. maj. 9,2 mm; min. 8; alt. 6,4. Windungen $3^3/_4$.

Farbe des Tieres in Spiritus: Grundfarbe bleichgelb, die beiden Mantellappen schwarz gefleckt, hintere Partie des Fußes an den Seiten mit dunklen Parallelstreifen, Rücken und Seitenrand der Fußsohle hell.

Helicarion perfragilis, v. Moellendorff.

1897. *Helicarion perfragilis*, v. MOELLENDORFF: Nachrbl. D. malak. Ges. Bd. 29, p. 58.

Depok, 9. III. 1904.

Hierher rechne ich zwei noch unausgewachsene Stücke, die mit mir vorliegenden Exemplaren dieser Art (von FRUHSTORFER erhalten) gut übereinstimmen.

Dyakia clypeus, Mousson.

1857. *Nanina clypeus*, MOUSSON: Journ. de Conchyliol. Bd. 6, p. 156.
1867. „ „ v. MARTENS: Ostasiat. Landmoll. p. 227.
1870—1876. „ „ PFEIFFER: Novitalis conchol. Vol. IV, p. 27, Taf. 115, Fig. 3—5.
1905. *Ariophanta clypeus*, KOBELT: MARTINI-CHEMNITZ, *Helix* Vol. E, p. 991, Taf. 25f, Fig. 1—3.
1912. *Dyakia clypeus*, SCHEPMAN: Proc. mal. Soc. London Vol. X, p. 231.

Buitenzorg, 24. II. bis 12. III. 1904.

1 Stück juv.

Hemiplecta duplocincta, v. Moellendorff.

1897. *Ariophanta duplocincta*, v. MOELLENDORFF: Nachrbl. D. malak. Ges. Bd. 29, p. 64.
1905. *Nanina duplocincta*, KOBELT: MARTINI-CHEMNITZ, *Helix* Vol. E, p. 989, Taf. 256, Fig. 11, 12.

Depok, 9. III. 1904.

2 Stück juv., nur Schalen.

Diam. maj. 12,9 mm; min. 11,4; alt. 7,7. Windungen $4^1/_2$.

2 junge Exemplare, die in der Skulptur der Oberseite und in den beiden dunkelbraunen Bändern gut mit v. MOELLENDORFFs Diagnose übereinstimmen. Die ersten zwei Windungen sind glatt und hornfarben; dann treten allmählich die Rippenstreifen auf.

Xestina arguta, Pfeiffer.

1859. *Helix arguta*, PFEIFFER: Monogr. Heliceor. viv. Vol. IV, p. 61.
1867. *Nanina (Hemiplecta) arguta*, v. MARTENS: Ostas. Landschn. p. 219.
1905. „ *(Xestina)* „ KOBELT: MARTINI-CHEMNITZ, *Helix* Vol. E, p. 981, Taf. 254, Fig. 8—11.

Tjompea, 11. III. 1904.

1 Stück ausgewachsen, 4 Stück juv.

Trochonanina multicarinata, Boettger.

1890. *Trochonanina multicarinata*, BOETTGER: Ber. Senckenb. Naturf. Ges. p. 141 Taf. 5. Fig. 2.

Tjibodas, 26. bis 28. III. 1904.

2 Stück ausgewachsen.

Diam. maj. 12,5 mm; min. 11.7; alt. 8.8. Windungen $6^1/_2$.
„ „ 12 „ „ 11.4; „ 8. „ 6.

2 anscheinend ausgewachsene Stücke, die gut mit der Beschreibung und Abbildung übereinstimmen. Die Gestalt ist etwas mehr kegelförmig, als die Abbildung zeigt. Die $1^1/_2$ ersten Windungen (Embryonalgewinde) sind horngelb und sehr fein, aber deutlich quergestreift. Auf der zweiten Windung tritt der erste feine Kielstreifen auf, deren Zahl sich auf den folgenden Windungen vermehrt, bis auf der letzten 10—11 vorhanden sind.

Sitala tjibodasensis nov. spec.

Schale gedrückt-kegelförmig, getürmt; Gewinde treppenförmig abgesetzt, eng durchbohrt, durchscheinend, horngelb. 4 Windungen, die letzte mit 2 Kielen, die oberen mit einem Kiel in der Mitte der Windung. Die ersten $1^1/_2$ Windungen noch ungekielt, wenig gewölbt, etwas heller gefärbt, mit schwachen Spirallinien skulptiert (am Anfang der zweiten Windung sind ca. 15 vorhanden). Dann beginnt auf der Mitte der Windung sich der obere Kiel zu zeigen, und zugleich bekommt die Windung ihre geschulterte Form. Der obere Teil fällt ziemlich steil und wenig gewölbt zum Kiel ab, während die untere Partie der Windung dann fast senkrecht zur Naht abfällt. Die Naht selbst ist gut berandet. Die feinen Spirallinien (Kutikularleistchen) ziehen äußerst zart und leicht gewellt über die Oberseite der Windungen (ca. 12 oberhalb des Kieles, ca. 15 unterhalb). An einigen Stellen treten die vertikalen Anwuchsstreifen etwas stärker hervor. Letzte Windung mit 2 Kielen, der untere genau in der Verlängerung der Naht an der Peripherie gelegen. Skulptur auf der Oberseite die gleiche, nur ziehen feine Vertikalrippchen in der Richtung der Anwuchsstreifen

voneinander entfernt stehend, über die Windungen. Unterseite gut gewölbt, mit denselben feinen Spirallinien wie die Oberseite, gekreuzt von in der Richtung der Anwuchsstreifen laufenden Streifchen. Mündung oval, an der Stelle, wo die Kiele auslaufen, winklig geknickt. Mundrand gerade, scharf, Columellarrand an der Durchbohrung kurz umgeschlagen.

Vor den javanischen Arten durch die 2 Kiele der letzten Windung ausgezeichnet; von *bilirata* BLANFORD durch die Größe und von *subbilirata* GODW. AUST. durch den engen Nabel unterschieden.

Tjibodas, 25. bis 28. III. 1904.

1 Stück ausgewachsen.

Diam. maj. 3 mm; alt. 2,6. Windungen 4.

Kaliella platyconus (BOETTGER Mskr.), v. Moellendorff.

Tafel, Figur 1.

1896. *Kaliella platyconus*, v. MOELLENDORFF: Nachrbl. D. malak. Ges. Bd. 28, p. 135 (nomen).

1897. „ „ v. MOELLENDORFF: Nachrbl. D. malak. Ges. Bd. 29, p. 59

Buitenzorg, 24. II. bis 12. III. 1904.

16 Stück, meist unausgewachsen und tot gesammelt.

Diam. maj. 3 mm; alt. 2,9. Windungen $4^3/_4$.

Die Skulptur besteht aus außerordentlich feinen, dicht gedrängt stehenden Vertikalstreifen, die auf den oberen Windungen von noch feineren, meist undeutlichen Spiralstreifen geschnitten werden, die später ganz verschwinden.

Kaliella acutiuscula, v. Moellendorff.

Tafel, Figur 2.

1897. *Kaliella acutiuscula*, v. MOELLENDOREF: Nachrbl. D. malak. Ges. Bd. 29, p. 59.

Tjibodas, 25. bis 28. III. 1904.

1 Stück juv. mit $4^1/_2$ Windungen.

Schale geritzt, pyramidenförmig, durchscheinend. Die ersten $1^1/_2$ Windungen mit sehr dicht stehenden (ca. 20 am Ende der ersten Windung), nur unter dem Mikroskop sichtbaren Spirallinien. Auf den späteren Windungen werden sie von ebenso feinen Vertikallinien gekreuzt, so daß eine gitterförmige Skulptur entsteht. Windungen schwach konvex, Naht wenig eingesenkt, letzter Umgang mit scharfem, fadenförmig vorspringendem Kiel.

Unterseite gut gewölbt; die Spirallinien auch um den Nabel herum deutlich bleibend, die Vertikallinien dagegen allmählich undeutlich werdend. Mündung schief, elliptisch, durch die letzte Windung ausgeschnitten. Mundrand gerade, scharf, am Nabel kurz umgeschlagen.

Lamprocystis nana (BOETTGER Mskr.), v. Moellendorff.

Tafel, Figur 3.

1897. *Lamprocystis nana*, v. MOELLENDORFF: Nachrbl. D. Malak. Ges. Bd. 29, p. 63.

Buitenzorg, 24. II. bis 11. III. 1904.

1 Stück tot gesammelt, ausgewachsen, 1 Stück juv.

Diam. maj. 2 mm; alt. 1,2.

Das mir vorliegende Stück stimmt mit von FRUHSTORFER erhaltenen Stücken der Art genau überein.

Oberseite flach, Apex kaum erhoben, Windungen fast flach, nur an der Naht etwas eingezogen. Die ersten 1½ Windungen glatt, die übrigen, außer den dicht stehenden Anwachsstreifen, mit entfernt stehenden, rippenartigen Streifen skulptiert, die auf der Unterseite nach dem Nabel zu undeutlich werden.

Lamprocystis sp. juv.

Tafel, Figur 4.

Buitenzorg, 24. II. bis 12. III. 1904.

Eine nicht ausgewachsene Schnecke zeichnet sich durch die interessante Skulptur seines Embryonalgewindes aus. Die ersten 1½ Windungen sind heller und mit feinen eingedrückten Punkten verziert, die dicht gereiht in Vertikal- und Spiralreihen angeordnet sind. Die übrigen Windungen zeigen dichtstehende feine Vertikalstreifen (in der Anwuchsrichtung verlaufend) und senkrecht dazu eine außerordentlich eng stehende, nur unter dem Mikroskop sichtbare Spiralskulptur.

Schale durchbohrt, scheibenförmig; Gewinde schwach kegelförmig erhoben, durchscheinend, gelblich. 3½ schwach gewölbte Windungen, langsam zunehmend, Naht etwas angedrückt, wenig eingeschnitten. Letzte Windung an der Peripherie gut gerundet; Unterseite gut gewölbt, die Skulptur nach dem Nabel zu allmählich schwächer werdend. Mündung fast senkrecht, elliptisch, durch die letzte Windung stark ausgeschnitten. Mundrand gerade, scharf. Spindelrand oben ganz kurz umgeschlagen.

Diam. maj. 1,8 mm; alt. 1,2.

Trochomorpha (Videna) planorbis, Lesson var. **javanica.** Mousson.

1849. *Helix planorbis javanica,* MOUSSON: Mollusk. Java p. 25, Taf. 2, Fig. 9.
1867. *Trochomorpha planorbis javanica,* v. MARTENS: Ostas. Landschn. p. 249, Taf. 13, Fig. 7.
1890. „ „ „ BOETTGER: Ber. Senckenb. Naturf. Ges. p. 142.

Tjibodas, 25. bis 28. III. 1904.

2 ausgewachsene Stücke; ohne jede Andeutung von Spiralstreifen.

Diam. maj. 15,3 mm; min. 13,4; alt. 4,6. Windungen $5^1/_4$.
„ „ 13 „ „ 11,4; „ 4,2. „ 5.

Trochomorpha (Videna) strubelli, Boettger.

1890. *Trochomorpha strubelli,* BOETTGER: Ber. Senckenb. Naturf. Ges. p. 143, Taf. 5, Fig. 5 a—c.

Tjompea, 11. III. 1904.

2 Stück juv.; durch höhere Form und Fehlen der Spiralfurchen auf der Oberseite von der ähnlichen *bicolor* PFEIFFER unterschieden.

Diam. maj. 9,2 mm; min. 8,5; alt. 4,4. Windungen 5.
„ „ 6,8 „ „ 6; „ 3,2. „ $4^1/_4$.

Chloritis (Trichochloritis) crassula, Philippi.

1845. *Helix crassula,* PHILIPPI: Abbild. Bd. 1 p. 152, Taf. 5, Fig. 3.
1867. „ „ v. MARTENS: Ostas. Landschn. p. 276.
1890. „ *(Chloritis) crassula,* BOETTGER: Ber. Senckenb. Naturf. Ges. p. 144, Taf. 5, Fig. 7.
1892. *Chloritis (Trichochloritis) crassula,* PILSBRY in: TRYON, Manual of Conch. Bd. 8, p. 271.

Tjompea, 11. III. 1904.

1 Stück juv.

Diam. maj. 12,2 mm; min. 10,6; alt. 8,4. Windungen 4.

Zu dieser Art rechne ich auch *Chloritis tetragyra,* v. MOELLENDORFF. Von FRUSTORFER erhaltene Stücke zeigen keinen Unterschied.

Eulota similaris Férussac var. **subsimilaris**, v. Martens.

1821. *Helix similaris,* FÉRUSSAC: Prodrom. Nr. 262.
1849. „ „ MOUSSON: Mollusk. Java p. 21, Taf. 2, Fig. 4—5.
1867. „ „ v. MARTENS: Ostas. Landschn. p. 271.
1890. „ „ BOETTGER: Ber. Senckenb. Naturf. Ges. p. 144.
1891. „ *(Eulotella) similaris,* v. MARTENS in: WEBER, Ergebnisse Bd. 2, p. 236.

Tjibodas, 25. bis 28. III. 1904.

2 Stück ausgewachsen; 10 Stück juv.; alle einfarbig hornfarben, ohne Band.

Diam. maj. 15,2 mm; min. 13,6; alt. 11.
.. .. 14,5 .. .. 12: .. 10,5.

Plectotropis sumatrana. v. Martens var. **moussoniana.** v. Martens.

1867. *Helix (Plectotropis) sumatrana* var. *moussoniana*, v. MARTENS: Ostas. Landschn. p. 266.
1888. „ „ „ „ „ TRYON: Manual of Conch. Bd. 4, p. 56.

Buitenzorg, 24. II. bis 12. III. 1904.

1 Stück ausgewachsen.

Diam. maj. 12 mm; min. 10,9; alt. 7. Windungen $5^1/_2$.

Tjibodas, 25. bis 28. III. 1904.

1 Stück nicht ganz ausgewachsen, aber schon mit schwach umgeschlagenem noch ungefärbtem Mundrand.

Diam. maj. 9,7 mm; min. 8,7; alt. 5,6. Windungen 5.

Tjompea, 11. III. 1904.

1 Stück ausgewachsen.

Diam. maj. 9,4 mm; min. 8,6; alt. 5,2. Windungen 5.

Die vorliegenden Stücke stimmen gut mit der Beschreibung von MARTENS überein. Sie zeigen sämtlich eine gut erhaltene Cuticula mit kleinen aufrecht stehenden Schüppchen (höchstens 0,1 mm lang), die nur auf dem gut ausgebildeten Kiel etwas länger werden und in der Richtung der Anwuchsstreifen stehen. Der Durchmesser des Nabels beträgt etwa $^1/_2$ vom größten Durchmesser.

Ob *squamulosa* (MOUSSON Mskr.). v. MARTENS in Ostas. Landschn. p. 266 dasselbe ist, wie ich vermuten möchte, kann ich ohne sicheres Vergleichsmaterial nicht entscheiden.

Plectotropis Kraepelini nov. spec.

Tafel, Figur 5—7.

Schale weit genabelt; Nabel trichterförmig, ungefähr gleich $^1/_3$ des größten Durchmessers; Gewinde niedergedrücktkegelförmig, dünn, gelblichhornfarben, fein gestreift durch in der Richtung der Anwuchsstreifen liegende Streifen, die auf der Unterseite von viel feineren Längsstreifen geschnitten werden. Cuticula hinfällig, wenn erhalten auf der Oberseite mit sehr feinen

in der Richtung der Querstreifen aufgerichteten Schüppchen besetzt. Naht sehr wenig eingedrückt, Apex stumpf, glatt. 5 Windungen, oben konvex, doch an der Naht abgeplattet, unten geschwollen; letzte Windung gegen die Mündung zu etwas erweitert und vorne wenig herabsteigend, deutlich gekielt, auf dem Kiel mit haarförmigen (0.4 mm langen) Schüppchen besetzt, um den Nabel herum nur sehr stumpf gewinkelt. Mündung ziemlich gerundet, schief, mit konvergierenden Rändern. Peristom innen weißlich, wenig verdickt, zurückgeschlagen; Spindelrand wenig verbreitert, sehr wenig den Nabel überragend.

Diese Art ist durch die an der Naht abgeplatteten Windungen und den Cilienkranz auf dem Kiel ausgezeichnet.

Tjibodas, 25. bis 28. III. 1904.

2 Stück.

Diam. maj. 11,3 mm; min. 9,1; alt. 5,5. Windungen 5.
.. .. 9 .. .. 7,8; .. 5. .. $4^1/_2$ [1]).

Plectotropis conoidea nov. spec.

Tafel, Figur 8, 9.

Schale weit genabelt, Nabel trichterförmig, etwas mehr als $^1/_3$ des größten Durchmessers betragend, breit-kegelförmig, dünnschalig, gelblich-hornfarben; feingestreift durch in der Anwachsrichtung liegende Streifen. Cuticule hinfällig, mit sehr dicht stehenden, kleinen erhobenen Schüppchen eng besetzt. Gewinde für die Gattung stark kegelförmig mit fast geraden Seiten; Naht wenig eingedrückt, Apex hornfarben, stumpf. 5 Windungen, oben sehr wenig konvex, fast gerade, unten wenig geschwollen. Letzte Windung kaum erweitert, wenig herabsteigend, Kiel bis zur Mündung deutlich, fadenförmig hervorspringend, mit feinen, schüppchenartigen Haaren besetzt, die aber sehr hinfällig sind (nur bei jungen Stücken deutlich). Letzter Umgang um den Nabel herum stumpf gekielt. Mündung ziemlich gerundet, schief, mit konvergierenden Rändern; Peristom innen weißlich, wenig verdickt, zurückgeschlagen; Spindelrand wenig verbreitert und sehr wenig über den Nabel hervorragend.

Durch Kleinheit und den kegelförmigen Aufbau der Windungen kenntlich.

Buitenzorg, 24. II. bis 12. III. 1904.

1 Stück ausgewachsen; 8 Stück juv.

[1]) Mundrand noch scharf.

Diam. maj. 9,2 mm; min. 8,2; alt. 5,8. Windungen 5.
„ „ 8,7 „ „ 7,8; „ 5,6. „ $4^3/_4$.
„ „ 7,7 „ „ 7; „ 4,6. „ 4.
„ „ 5,4 „ „ 4,8; „ 3,2. „ $3^1/_2$.

Amphidromus palaceus (v. d. Busch), Mousson var. **appressus** (Mousson), v. Martens.

1867. *Bulimus appressus* (Mousson i. coll.), v. Martens: Ostas. Landschn. p. 353.
1890. *Amphidromus appressus*, Boettger: Ber. Senckenb. Naturf. Ges. p. 145, Taf. 5, Fig. 8.
1896. „ *palaceus appressus*, Fulton: Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 17, p. 72.
1900. „ „ „ Pilsbry in: Tryon, Manual of Conch. Bd. 13, p. 136, Taf. 47, Fig. 7; Taf. 46, Fig. 15.

Tjibodas, 25. bis 28. III. 1904.

2 Stücke.

Diam. maj. 25 mm; alt. 51,6; long. apert. 22,5. Windungen 7.

Letzte Windung schwefelgelb, fünfte und sechste grünlich scheinend, die oberen blaßgelblich; Peristom reinweiß; rechts gewunden.

Diam. maj. 22 mm; alt. 38; long. apert. 19,6. Windungen 6.

1 unausgewachsenes Stück. Letzte Windung schön schwefelgelb, die fünfte grünlich, die oberen wieder gelblich.

Amphidromus (Syndromus) porcellanus, Mousson.

1849. *Bulimus porcellanus*, Mousson: Moll. Java p. 33, 110, Taf. 3, Fig. 4.
1890. *Amphidromus* „ Boettger: Ber. Senckenb. Naturf. Ges. p. 146.
1891. „ „ v. Martens in: Weber, Ergebnisse, Bd. 2, p. 241.
1900. „ „ Pilsbry in: Tryon, Manual of Conch. Bd. 13, p. 201, Taf. 64, Fig. 5—7.

Buitenzorg (Botan. Garten) 24. II. bis 12. III. 1904.

1 Stück juv.

Diam. maj. 9,2 mm; alt. 13,3; long. apert. 7,3. Windungen $4^1/_2$.

Amphidromus inversus, Müller.

1774. *Helix inversus*, Müller: Verm. terr. et fluviat. Hist. II, p. 93.
1867. *Bulimus* „ v. Martens: Ostas. Landschn. p. 337.
1900. *Amphidromus* „ Pilsbry in: Tryon, Manual of Conch. Bd. 13, p. 167, Taf. 56, Fig. 91, 92.

Singapore, 15. II. 1904.

1 Stück juv., rechts gewunden.

Diam. maj. 22 mm; alt. 35; long. apert. 19,5. Windungen 6.

Prosopeas achatinaceum, Pfeiffer.

Bulimus achatinaceus, PFEIFFER: Symbolae III, p. 82.
1848. .. „ PFEIFFER: Monogr. Heliceor. viv. Vol. II, p. 156.
1849. „ „ MOUSSON: Moll. Java, p. 35, Taf. 4, Fig. 4.
1867. *Stenogyra* „ V. MARTENS: Ostas. Landschn. p. 375, Taf. 22, Fig. 9.
1891. „ „ V. MARTENS in: WEBER, Ergebnisse Bd. 2, p. 243.
1906. *Prosopeas* „ PILSBRY in: TRYON, Manual of Conch. Bd. 18, p. 21, Taf. 5, Fig. 40, 41.

Buitenzorg, 24. II. bis 12. III. 1904.

10 Stück ausgewachsen, 4 Stück juv. Die ersten beiden Windungen glatt, weißlich-durchscheinend; Apex gerundet. Schale undurchbohrt.

Diam. maj. 4,6 mm; alt. 14,5; long. apert. 4,6; diam. apert. 2,6. Windungen 9.
.. .. 4,6 .. .. 15; .. .. 5,1; .. .. 2,2. .. $8\frac{1}{2}$.
.. .. 4,6 .. .. 14; .. .. 4,8; .. .. 2,5. .. $8\frac{1}{2}$.
.. .. 4 .. .. 13,1; .. .. 4,4; .. .. 2,3. .. $8\frac{1}{2}$.
.. .. 4,3 .. .. 12,1; .. .. 4,3; .. .. 2,2. .. 8.
.. .. 4,2 „ „ 12,8; „ „ 4,6; „ „ 2,2. „ $7\frac{1}{2}$.
.. .. 4,1 .. .. 12,1; .. .. 4,2; .. .. 2,1. .. $7\frac{1}{2}$.
.. „ 4,6 .. „ 12,9; „ „ 4,6; „ „ 2,6. „ 8.
.. „ 4,3 „ „ 12,4; „ „ 4,6; „ „ 2,1. „ 8.
.. .. 4,2 .. .. 11,9; .. .. 4,8; .. .. 2,2. .. $7\frac{1}{2}$.
.. .. 4 .. .. 9,6; .. .. 3,8; .. .. 2. .. 7.
.. .. 3,7 .. .. 8,2; .. .. 3,8; .. „ 1,8. „ 6.

Subulina octona, Bruguière.

1792. *Bulimus octona*, BRUGUIÈRE: Encyclop. Méthod. I, p. 325.
1890. *Subulina* „ BOETTGER: Ber. Senckenb. Naturf. Ges. p. 147.
1906. .. .. PILSBRY in: TRYON: Manual of Conch. Bd. 18, p. 72, Taf. 12, Fig. 8, 9.

Buitenzorg, 24. II. bis 12. III. 1904.

2 Stück.

Diam. maj. 4,3 mm; alt. 15,3; alt. apert. 4. Windungen 8.
.. „ 4,2 „ „ 14,8; .. „ 4. „ 8.

Japonia (Lagochilus) obliquistriata, Bullen.

1904. *Japonia (Lagochilus) obliquistriata*, BULLEN: Proc. mal. Soc. London Vol. VI, p. 110, Taf. 6, Fig. 4, 5.

Var. **depressa** nov. var.

In allem mit dem Typus übereinstimmend, aber das Gewinde gedrückter.

Depok, 9. III. 1904.

1 Stück.

Diam. maj. 7,2 mm; min. 5,8; alt. 6,7. Windungen 5.

Pupina (Tylotoechus) treubi, Boettger.

1890. *Pupina (Eupupina) treubi*, Boettger: Ber. Senckenb. Naturf. Ges. p. 157, Taf. 6, Fig. 8.
1902. „ *(Tylotoechus)* „ Kobelt in: Tierreich *Cyclophoridae* p. 324.

Tjibodas, 25. bis 28. III. 1904.

1 Stück.

Diam. 4,8 mm; alt. 7,3. Windungen 5.

Diplommatina (Sinica) hortulana nov. spec.

Tafel, Figur 10, 11.

Schale rechts gewunden, kaum geritzt, länglich kegelförmig, ziemlich dünnschalig, mit ziemlich dichtstehenden, fadenförmigen Rippen (ca. 40 auf der letzten Windung). Gewinde ziemlich hoch, fast regelmäßig kegelförmig. Apex stumpf, die obersten $1\frac{1}{2}$ Windungen glatt, dann mit der Rippenstreifung beginnend, zwischen den Rippen mit sehr feinen, nur unter dem Mikroskop sichtbaren Spiralstreifen versehen. 7 gewölbte Windungen, letzte kaum verdreht, vorne kurz ansteigend; Mündung wenig schräg, kurz eiförmig. Mundrand doppelt, äußerer gut ausgebreitet, an der Spindel eine undeutliche Ecke bildend, dann verschmälert; innerer Mundrand verdickt, wenig ausgebreitet. Spindelfalte wagerecht, gut sichtbar; Gaumenfalte mäßig ausgebildet.

Buitenzorg, 24. II. bis 12. III. 1904.

30 Stück.

Diam. 1,2 mm; alt. 2,7. Windungen 7.

Diplommatina (Sinica) auriculata, v. Moellendorff.

1897. *Diplommatina (Sinica) auriculata*, v. Moellendorff: Nachrbl. D. malak. Ges. Bd. 29, p. 95.
1902. „ „ „ Kobelt in: Tierreich *Cyclophoridae* p. 456.

Tjibodas, 25. bis 28. III. 1904.

1 Stück ausgewachsen; 1 Stück juv.

Diam. 2.1 mm; alt. 4.

Süßwassermollusken.

Limnaea javanica, Mousson.

1849. *Limnaea javanica,* MOUSSON: Mollusk. Java p. 42, Taf. 5, Fig. 1.
1867. „ „ V. MARTENS: Malak. Blätter Bd. 15, p. 222—225.
1881. „ „ V. MARTENS: Conchol. Mitth. Bd. 1, p. 87—91, Taf. 10.
1890. „ „ BOETTGER: Ber. Senckenb. Naturf. Ges. p. 150.
1897. „ „ V. MARTENS in: WEBER, Ergebnisse Bd. 4, p. 3, Taf. 1, Fig. 3—7.
1912. „ „ SCHEPMAN: Proc. mal. Soc. London Vol. 10, p. 235.

Var. **intumescens**, v. Martens.

1867. *Limnaea j. intumescens,* V. MARTENS: Malak. Blätter Bd. 15, p. 223.
1881. „ „ „ V. MARTENS: Conchol. Mitth. Bd. 1, p. 88, Taf. 10, Fig. 2—4.
1890. „ „ „ BOETTGER: Ber. Senckenb. Naturf. Ges. p. 150.
1897. „ „ „ V. MARTENS: WEBER, Ergebnisse Bd. 4, p. 3, Taf. 1, Fig. 5.

Depok, 9. III. 1904.

2 Stück ausgewachsen; 11 Stück juv.

Die Stücke den Figuren 2 und 3 bei V. MARTENS 1881 entsprechend, mit kurzem, aber spitzem Gewinde und wenig verflachtem letzten Umgang; alle Exemplare mit starkem Glanz auf der Schale.

Diam. maj. 12 mm; min. 9,7; alt. 19,7.
.. .. 10,7 „ „ 8,7; „ 20,2 [1]).

Buitenzorg, 24. II. bis 12. III. 1904.

1 Stück ausgewachsen; 7 Stück juv. (wie vorige).

Diam. maj. 11 mm; min. 9; alt. 18,7.

Tjitajam, 3. III. 1904.

10 Stück juv.

Tjibodas, 15. bis 28. III. 1904.

11 Stück juv.

Planorbis compressus, Hutton.

1834. *Planorbis compressus,* HUTTON: Journ. asiat. Soc. Beng. Vol. III, p. 93—94.
1897. „ „ V. MARTENS in: WEBER, Ergebnisse Bd. 4, p. 13, Taf. 1, Fig. 17—19.
1849. „ *tondanensis,* (nec QUOY et GAIMARD) MOUSSON: Mollusk. Java p. 44, Taf. 5, Fig. 4.

[1]) Ziemlich schlanke Form.

Buitenzorg, 24. II. bis 12. III. 1904.

8 Stück ausgewachsen; 5 Stück juv.

Diam. maj. 6 mm; min. 5; alt. 1,7.

Tjitajam, 8. III. 1904.

6 Stück ausgewachsen; 10 juv.

Der Kiel auf der letzten Windung ist nur schwach angedeutet.

Melania (Sulcospira) testudinaria, v. d. Busch.

1845. *Melania testudinaria*, v. d. Busch in: Philippi, Abbild. Taf. 1, Fig. 14.
1849. „ „ Mousson: Mollusk. Java p. 66, Taf. 11, Fig. 1—3.
1874. „ *(Pachychilus) testudinaria*, Brot in: Martini-Chemnitz, Melaniaceen p. 49, Taf. 6, Fig. 3.
1890. „ *(Sulcospira) testudinaria*, Boettger: Ber. Senckenb. Naturf. Ges. p. 151.
1912. „ „ „ Schepman: Proc. mal. Soc. London Vol. 10, p. 236.

Buitenzorg, 24. II. bis 12. III. 1904.

20 Stück in verschiedenen Altersstufen, aber alle noch unausgewachsen. Sämtlich an der Spitze dekolliert. Die letzte Windung hellhornfarbengelb mit deutlicher Flammenzeichnung.

Diam. maj.	12	mm;	min.	11;	alt.	27.	Erhaltene	Windungen			4½.
„ „	11,5	„	„	10;	„	25,7.	„	„			4½.
„ „	11	„	„	9,6;	„	24,5.	„	„			5.
„ „	9,6	„	„	9,1;	„	20,8.	„	„			4½.
„ „	9,5	„	„	8,2;	„	20.	„	„			4½.

Buitenzorg, 24. II. bis 12. III. 1904.

6 Stück. Alle dunkel, fast schwarz gefärbt mit hellem erdigen Überzug. Um die Basis herum mit deutlichen Spiralstreifen (ca. 5), darüber auf der letzten Windung eine Reihe schwächer ausgebildeter. Einige Exemplare mit ganz flachen Windungen.

Diam. maj.	13,8	mm;	min.	12,6;	alt.	34,6.	Erhaltene	Windungen			6.
„ „	12,2	„	„	11,4;	„	32,2.	„	„			6 [1]).
„ „	12	„	„	11,2;	„	31,7.	„	„			5 [2]).
„ „	13,2	„	„	12,3;	„	35,6.	„	„			6.
„ „	13,7	„	„	12,4;	„	32,7.	„	„			5.
„ „	12	„	„	11;	„	30.	„	„			5.

[1]) Sehr flache Windungen.
[2]) Schlank, mit etwas stärker gewölbten Windungen.

Melania (Brotia) subplicata, Schepman.

1880. *Melania subplicata,* SCHEPMAN in: VETH, Midden-Sumatra, Mollusca p. 14, Taf. 1, Fig. 6.
1897. „ *(Brotia) subplicata,* v. MARTENS in: WEBER, Ergebnisse IV, p. 37, Taf. 2, Fig. 15.

Buitenzorg, 24. II. bis 12. III. 1904.

9 Stück ausgewachsen und einige juv.

Mit *Zollingeri* nahe verwandt, es fehlen aber die Längslinien, die auf den Rippen Knötchen bilden, gänzlich.

Diam.	maj.	9,5	mm;	min.	8,6;	alt.	21,6;	alt. ap.	9;	diam. ap.	4,7.	Erh.	Wind.	4.
..	..	9,6	„	„	8,6;	„	21,8;	„ „	9,2;	„ „	5,2.	„	„	4.
..	..	8	„	„	7,7;	„	21,3;	„ „	7,8;	„ „	5,3.	„	„	5.
..	..	7,7	„	„	7;	„	17,3;	„ „	7;	„ „	4.	„	„	4.
..	..	7,2	„	„	6,7;	„	17,5;	„ „	6,2;	„ „	3,6.	„	„	5.
..	..	7	„	„	6,4;	„	15,1;	„ „	6,3;	„ „	3,4.	„	„	3½.
..	..	7,4	„	„	6,9;	„	16,4;	„ „	7;	„ „	3,5.	„	„	3½.
..	..	6,3	„	„	5,6;	„	12,3;	„ „	5,5;	„ „	3,2.	„	„	3.

Melania (Melanoides) tuberculata, Müller.

1774. *Melania tuberculata,* MÜLLER: Verm. Nr. 378.
1849. „ „ MOUSSON: Mollusk. Java p. 73, Taf. 11, Fig. 6, 7.
1874. „ „ BROT in: MARTINI-CHEMNITZ, Melaniaceen p. 248, Taf. 29, Fig. 11.
1897. „ „ v. MARTENS in: WEBER, Ergebnisse IV p. 56.

Garoet, 22. III. 1904.

3 Stück juv., var. *α plicifera,* v. MARTENS 1897 p. 56.

Diam.	maj.	7,5	mm;	min.	6,9;	alt.	22,2.	Windungen	11.
..	..	5,7	„	„	5,2;	„	16,8.	„	11.
..	..	5	„	„	4,8;	„	15,8.	„	10.

Buitenzorg, 24. II. bis 12. III. 1904.

3 Stück juv., ebenfalls var. *α plicifera.*

Diam.	maj.	7,3	mm;	min.	6,9;	alt.	20.	Windungen	6.
..	..	7	„	„	6,4;	„	18.	„	5.
..	..	7	„	„	6,4;	„	16,8.	„	4.

Melania (Tarebia) lineata Gray var. **semigranosa**, v. d. Busch.

1842—1845. *Melania semigranosa*, v. d. Busch bei Philippi, Abbild. Bd. 1, p. 2; *Melania* Taf. 1, Fig. 13.
1874. „ *lirata* var. γ, Brot in: Martini-Chemnitz, Melaniaceen p. 329, Taf. 33, Fig. 6 b.
1897. „ „ *semigranosa*, v. Martens in: Weber, Ergebnisse IV p. 72.

Garoet. 22. III. 1904.

3 Stück ausgewachsen, 4 Stück juv.

Alle Stücke mit ganz erhaltener Spitze. Auf den oberen Windungen mit 3 Körnchenreihen; auf der letzten mit 4; die schwarzen Spirallinien waren sehr undeutlich erhalten, meist fehlend. Bei einigen Exemplaren auf der Peripherie mit einer ca. 2 mm breiten, dunkelbraunen Binde.

Diam. maj.	11,4	mm; min.	10;	alt.	24,6;	alt. apert.	12.	Erhalt. Windungen	7.
„ „	10,2	„ „	9,6;	„	23,7;	„ „	10.	„ „	7.
„ „	11	„ „	9,8;	„	24,5;	„ „	11,3.	„ „	7.
„ „	8,8	„ „	8;	„	19,4;	„ „	9,4.	„ „	6.
„ „	8	„ „	7,3;	„	17,2;	„ „	8,9.	„ „	6.

Melania (Tarebia) tjibodasensis nov. spec.

Tafel, Figur 12.

Gehäuse getürmt, festschalig, mit dunkler schwarzgrüner Epidermis. Gewinde oben ziemlich stark dekolliert; ungefähr 4 erhaltene Windungen, schwach konvex, durch eine eingedrückte Naht geschieden. Obere Umgänge mit 6 Reihen rundlicher Körner, die in etwas mehr weniger konvexen Vertikalreihen untereinander sitzen und die durch Zwischenräume von etwa der Breite der Körner voneinander getrennt sind. Letzter Umgang unterhalb der Körnerreihen mit flachen Spiralreifen, die nach der Basis zu schmäler werden und eng zusammenstehen. Bei einigen Exemplaren verschmelzen die Körner der unteren Reihen miteinander zu flachen Spiralreifen. An der Peripherie liegt zwischen den breiten Reifen in den Zwischenräumen häufig ein schmaler Reif. Mündung spitz eiförmig, an der Basis gerundet, ergossen; Columella etwas gedreht, verdickt; Parietalkallus deutlich aber nicht sehr stark ausgebildet. Außenrand scharf, oben eingezogen, unten vorspringend.

Tjibodas, 25. bis 28. III. 1904.

5 Stück.

Diam. maj. 14,4 mm; min. 12,9; alt. 34,1; long. ap. 15; diam. ap. 7. Erh. Wind. 4.
.. .. 13,8 „ .. 12,8; „ 31; „ „ 14,1; „ „ 7,4. „ „ 4.
.. .. 15 „ .. 13,7; „ 31,8; „ .. 15; „ „ 7. „ „ 4.
.. .. 12,3 „ .. 11; „ 28,5; „ .. 12,8; „ .. 6,2. „ .. 4.
.. .. 11,3 „ „ 10,3; „ 24,4; „ „ 11,7; „ „ 5,8. „ .. 4.

Diese Form, die ich mit keiner der bis jetzt beschriebenen identifizieren kann, scheint mir der *procera* BROT (MARTINI-CHEMNITZ, Melaniaceen p. 319, Taf. 33, Fig. 5) unbekannter Herkunft am nächsten zu stehen. Aber die Farbe dieser Form wird als hellgrün angegeben. Außerdem stimmt die Skulptur nicht überein, auch sind die Körnchen bei unserer Form (nach der Abbildung zu urteilen) erheblich kleiner.

Canidia helena (MEDER) PHILIPPI.

1847. *Melania helena,* MEDER bei PHILIPPI: Abbild. Bd. 2, p. 170, Taf. 4, Fig. 4.
1849. *Melanopsis* „ MOUSSON: Mollusk. Java p. 64, Taf. 10, Fig. 2.
1897. *Canidia* „ v. MARTENS in: WEBER, Ergebnisse IV, p. 75.
1912. „ „ SCHEPMAN: Proc. mal. Soc. London Vol. X, 236.

Buitenzorg. 24. II. bis 12. III. 1904.

1 Stück juv. Das Embryonalgewinde ausgebrochen. Die Falten treten noch wenig hervor, die Schale selbst ist mit einer feinen Cuticula bedeckt.

Diam. maj. 6,4 mm; min. 5,9; alt. 13,2. Erhaltene Windungen 4.

Vivipara javanica, v. d. Busch.

1845. *Paludina javanica,* v. D. BUSCH in: PHILIPPI, Abbild. I, p. 105, Taf. 1, Fig. 11, 12.
1849. „ „ MOUSSON: Mollusk. Java p. 61, Taf. 8, Fig. 3, 4.
1865. „ „ v. MARTENS: Malak. Blätter p. 150.
1890. *Vivipara* „ BOETTGER: Ber. Senckenb. Naturf. Ges. p. 155.
1897. „ „ v. MARTENS in: WEBER, Ergebnisse IV, p. 21.
1908. „ „ KOBELT in: MARTINI-CHEMNITZ, Paludiniden p. 251, Taf. 52, Fig. 1–7.

Buitenzorg, 24. II. bis 12. III. 1904.

6 Stück, alle an der Spitze angefressen und wohl alle noch unausgewachsen. Die (ca. 40 an der Zahl) feinen, mit Härchen besetzten Spiralreifen nur an der Mündung (auf einer Strecke von 5 mm) deutlich, weiter nach oben allmählich verschwindend. Letzte Windung mit deutlicher Kante; im übrigen die Gestalt wie KOBELT 1908 Taf. 52, Fig. 1, 2. Deckel wie bei KOBELT beschrieben.

Diam. maj. 16,3 mm; min. 14,3; alt. 23; alt. ap. 2,5; diam. ap. 9,5. Erh. Wind. 5.
.. .. 15 „ .. 13 „ 21,3 „ „ 11,5; „ „ 8,4. „ „ 5.
.. .. 14 „ .. 13 „ 20,2 „ „ 11; „ „ 8. „ „ 5.

Buitenzorg (Botan. Garten), 24. II. bis 12. III. 1904.

7 Stücke wie oben, aber die Spiralskulptur etwas deutlicher.

Diam.maj. 16,6 mm; min. 15; alt. 21,3; alt.ap. 12,2; diam.ap. 9,2. Erh. Wind. 4.
.. .. 13,2 „ .. 11,7; .. 17,5; „ .. 10; .. „ 7. „ .. 4½.

Buitenzorg (Botan. Garten), 24. II. bis 12. III. 1904.

1 Stück mit sehr stark erodierter Spitze.

Diam.maj. 19.3 mm; min. 17.4; alt. 26.4; alt.ap. 14.4; diam.ap. 10.7. Erh. Wind. 4.

Garoet. 22. III. 1904.

2 Stück mit deutlichem Kiel.

Diam.maj. 19 mm; min. 17.5; alt. 26.2; alt.ap. 13.2; diam.ap. 10,5. Erh. Wind. 5.
.. .. 16,2 „ .. 14,4; „ 21,5; .. .. 11,4; .. „ 9,1. „ „ 6[1]).

Depok, 9. III. 1904.

3 Stück.

Diam.maj. 16,4 mm; min. 15; alt. 25; alt.ap. 12.2; diam.ap. 9.3. Erh. Wind. 6½[2]).
.. .. 15 „ „ 14,4; „ 20,5; „ „ 11,5; .. „ 9. „ .. 4[2]).
.. .. 14 „ „ 12,5; „ 20; „ „ 10,5; .. „ 7,8. „ „ 5½[3]).

Ampullaria (Pachylabra) scutata, Mousson.

1849. *Ampullaria scutata*, MOUSSON: Mollusk. Java p. 60, Taf. 8, Fig. 2.
1897. „ „ v. MARTENS in: WEBER, Ergebnisse IV, p. 18.
1912. „ „ SCHEPMAN: Proc. mal. Soc. London Vol. X, p. 236.
1828. „ *conica*, GRAY in: WOOD, Index testac. Suppl. Taf. 7, Fig. 22.
1890. „ „ v. *javanica*, BOETTGER: Ber. Senckenb. Naturf. Ges. p. 156.
1912. „ „ KOBELT in: MARTINI-CHEMNITZ, *Ampullariidae* p. 93, Taf. 40, Fig. 1—5.

Buitenzorg, 24. II. bis 12. III. 1904.

Diam.maj. 37 mm; min. 31.2; alt. 44.2; alt. ap. 30,4; diam. ap. 17.8. Wind. 4½.
.. „ 31,2 „ „ 27,6; „ 37,7; „ „ 26; „ „ 14,5. „ 4½.
.. .. 29,3 .. .. 24.8; .. 35; .. .. 25.9; .. .. 13.3. .. 4.
.. .. 28,7 „ „ 25; „ 33,8; „ „ 25,7; „ „ 14,6. „ 4¼.
.. .. 29,5 „ „ 25; „ 33,3; „ „ 26; .. „ 14,2. „ 4½.
.. .. 25,5 „ „ 22,7; „ 30,3; „ „ 22,8; „ „ 11,6. „ 4½.
.. .. 25,5 „ „ 22,6; „ 31,6; „ „ 23; „ „ 13,7. „ 4¼.

[1]) Embryonalgewinde erhalten.
[2]) Alle erhalten.
[3]) Stark korrodiert.

Die meisten Stücke scheinen noch unausgewachsen, stimmen aber gut mit der Figur 4, 5, Tafel 40, in MARTINI-CHEMNITZ überein. Sämtlich sind sie an der Spitze korrodiert, ebenso ist bei allen der Nukleus des Deckels mehr oder weniger angefressen. Die einzelnen Stücke stimmen trotz der auffallenden Größendifferenz gut miteinander überein.

Corbicula ducalis, Prime.

1862. *Corbicula ducalis*, PRIME in: Proc. Boston Soc. nat. Hist. VIII, p. 274; Ann. Lyc. New York VIII, p. 225, Fig. 58; Bull. Mus. comp. Zool. V, p. 43.
1897. „ „ v. MARTENS in: WEBER, Ergebnisse IV, p. 114.
1912. „ „ SCHEPMAN: Proc. mal. Soc. London X, p. 238.
1847. „ *fluminea* (MÜLLER) PHILIPPI: Abbild. Vol. 2, p. 76, Taf. 1, Fig. 3.
1849. „ „ MOUSSON: Mollusk. Java p. 87, Taf. XV, Fig. 3.
1890. „ „ BOETTGER: Ber. Senckenb. Naturf. Ges. p. 163.

Buitenzorg (Botan. Garten), 24. II. bis 12. III. 1904.

18 Stück verschiedener Größe, mit den MOUSSONschen Figuren gut übereinstimmend.

Länge 25 mm; Höhe 21,3; Tiefe 15.
„ 25 „ „ 20,6; „ 14.
„ 24,6 „ „ 19,5; „ 14.
„ 20,3 „ „ 16,6; „ 11,8.
„ 20,8 „ „ 16,5; „ 12.
„ 16.2 „ „ 13.7; „ 10,3.

Garoet, 22. III. 1904.

3 Stück einer etwas kürzeren und höheren Form, aber sonst nicht verschieden.

Länge 22 mm; Höhe 18,5; Tiefe 13,2.
„ 20,1 „ „ 17; „ 12,3.
„ 17.5 „ „ 15.1; „ 10,2.

Verzeichnis aller bisher aus Java bekannt gewordener Land- und Süßwassermollusken.

Ennea		
bicolor	HUTTON 1834, Journ. asiat. Soc. Calcutta p. 86	—
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 384	Sumenap auf Madura
	KOBELT in MARTINI-CHEMNITZ, Agnatha p. 128, Taf. 19, Fig. 1—3	—
Helicarion		
adolfi	BOETTGER 1890, Ber. Senckenb. Ges. p. 138, Taf. 5, Fig. 1	Gunung Salak
	v. MARTENS 1891 in WEBER, Ergebn. II, p. 223	Tjibodas [WEBER]
	SCHEPMAN 1912, Proc. mal. Soc. X, p. 231	Gunung Gedeh; Gunung Ungaran
	diese Arbeit p. 205	Tjompea, Depok, Tjibodas
(= *agilis*)	v. HASSELT Mskr., v. MARTENS in WEBER	Pangerango
albellus	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 186	bei Wonosari auf dem Tengergebirge [ZOLLINGER]
(= *wonosariensis*)	(MOUSSON i. coll.)	—
fruhstorferi	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 58	Java [FRUHSTORFER]
lineolatus	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 184, Taf. 12, Fig. 4	Java [ZOLLINGER]
perfragilis	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 58	Java [FRUHSTORFER]
	diese Arbeit p. 206	Depok
Vitrinopsis		
collingei	SCHEPMAN 1912, Proc. mal. Soc. X, p. 229, Textfig.	Tengergebirge
sp.	BOETTGER 1891, Ber. Senckenb. Ges. p. 242	Arga Sarie
Atopos		
ouwensi	COLLINGE 1908, Journ. Conchyl. XII, p. 119	Bot. Garten Buitenzorg [Major OUWENS]
Parmarion		
luteus	(MOUSSON i. coll.) v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 182	Litjin (Res. Banjuwangi) [ZOLLINGER]
maculosus	WIEGMANN 1898, Abh. Senckenb. Ges. 24, p. 299, Taf. 21, Fig. 8 bis 26	Buitenzorg [KÜKENTHAL]
planus	(MOUSSON i. coll.) v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 182	Litjin (Res. Banjuwangi) [ZOLLINGER]
pupillaris	HUMBERT 1863, Mém. Soc. Genève XVII, p. 109, Taf., Fig. 1	Litjin (Res. Banjuwangi) [ZOLLINGER]

Parmarion		
pupillaris	v. Martens 1867, Ostas. Landschn. p. 179, Taf. 5, Fig. 7, 8; Taf. 12, Fig. 3	Java, in den Berggegenden [v. Hasselt]
	Boettger 1891, Ber. Senckenb. Ges. p. 242	Arga Sarie in 5000 Fuß Höhe
	Simroth 1893 in Weber, Ergebn. III, p. 106	Arga Sarie (Bandong)
	Collinge 1899, Ann. N. H. (7), IV, p. 397, Taf. 7, Fig. 1, 2	Geda
	Schepman 1912, Proc. mal. Soc. X, p. 231	Gunung Ungaran
v. *punctata*	v. Martens 1867, ibid. p. 180	Modjopahit unweit Modjokerta (Res. Surabaja) [v. Martens]; am Abhange des Berges Salak beim Bach Tapos [v. Hasselt]
v. *marmorata*	v. Martens 1867, ibid. p. 180	bei Tji-surupan unweit Bandong (Preanger), ca. 4000 Fuß [v. Martens]
v. *vittata*	v. Martens 1867, ibid. p. 180	bei Sindang-laya, östl. Buitenzorg, 3400 Fuß [v. Martens]
reticulatus	v. Hasselt 1823 Mskr., v. Martens in Weber, Ergebn. II, p. 221, Taf. 12, Fig. 24, 25	Buitenzorg und Tjibodas [v. Martens]
taeniatus	v. Hasselt 1823 Mskr., v. Martens in Weber, Ergebn. II, p. 222, Taf. 12, Fig. 26 (= *Microparmarion strubelli*, Simroth Mskr. cf. Collinge)	Buitenzorg
weberi	Simroth 1893 in Weber, Ergebn. III, p. 105	Buitenzorg [Weber]
	Simroth 1898, Zool. Jahrb. System. XI, p. 161, Taf. 15, Fig. 11, 12	—
	Collinge 1899, Ann. N. H. (7), IV, p. 398	Geda
Microparmarion		
austeni	Simroth 1893 in Weber, Ergebn. III, p. 109	Arga Sarie (Bandong)
	Simroth 1898, Zool. Jahrb. System. XI, p. 165	—
	Collinge 1899, Ann. N. H. (7), IV, p. 398, Taf. 7, Fig. 3—10	Geda
boettgeri	Simroth 1898, Zool. Jahrb. System. XI, p. 165, Taf. 15, Fig. 24—26	Java [Fruhstorfer]
fruhstorferi	Simroth 1898, Zool. Jahrb. System. XI, p. 164, Taf. 15, Fig. 16—22	Java [Fruhstorfer]
jacobsoni	Schepman 1912, Proc. mal. Soc. X, p. 232, Taf. 10, Fig. 3—8	Nongkodjadjar
javanica	Collinge 1899, Ann. N. H. (7), IV, p. 400, Taf. 8, Fig. 11—19	Geda

Collingea strubelli	SIMROTH 1893 in WEBER, Ergebn. III, p. 108	Arga Sarie (Bandong) und Buitenzorg
Philomycus striatus	v. HASSELT 1823, Allg. Konst. Ledd. Bod. p. 232	Java, in den Urwäldern der höheren Gegenden
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn, p. 178	im mittleren Java [v. MARTENS]
	v. MARTENS 1891 in WEBER, Ergebn. II, p. 233	Tjibodas [WEBER]
Hemiplecta acelidota	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 65	Java [FRUHSTORFER]
	KOBELT in MARTINI-CHEMNITZ, *Helix* p. 995, Taf. 257, Fig. 12 und 13	—
v. *robusta*	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 65	Java [FRUHSTORFER]
acutecarinata	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 64	Java [FRUHSTORFER]
arguta	PFEIFFER 1856, Proc. Zool. Soc. p. 327	—
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 219	bei Buitenzorg [ZOLLINGER]; Sindang-laya [v. MARTENS]; östl. Java im Tengergebirge [Koll. CUMING u. v. MARTENS]
	KOBELT in MARTINI-CHEMNITZ, *Helix* p. 981, Taf. 254, Fig. 8—11	Java [Koll. v. MOELLENDORFF]
	BOETTGER 1891, Ber. Senckenb. Ges. p. 242	Gunung Gedeh; Westjava [STRUBELL]; Tengergebirge Ostjava [FRUHSTORFER]
	diese Arbeit p. 207	Tjompea
bataviana	v. D. BUSCH in PFEIFFER 1842, Symbolae II, p. 17	—
	PHILIPPI Abbild. I, Taf. I, Fig. 3	—
	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 17, Taf. 1, Fig. 1; Taf. 20, Fig. 1	Tjikoya [ZOLLINGER] östl. Java [ibid.]
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 217	westl. Java nicht selten; bei Buitenzorg [v. HASSELT und TEYSMANN]; Sindang-laya [v. MARTENS]; bei Palabuan [v. MARTENS]; mittleres Java in der Res. Banjuma; bei Adjibarang u. Bandjarnegara [JAGOR]
(= *induta*)	PFEIFFER, Monogr. I, p. 79 juv.	—
centralis	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 17, Taf. 2, Fig. 1	östl. Java
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 219	Tjisurupan (Preanger) [v. MARTENS]

Hemiplecta		
densa	ADAMS et REEVE 1850, Voyage Samarang, Moll. p. 62, Taf. 16, Fig. 8	—
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 230	bei Adjibarang (Res. Banjuma) [JAGOR]
v. *herklotsiana* . .	DOHRN 1859, Malak. Blätter VI, p. 206	—
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 230	Java
	KOBELT in MARTINI-CHEMNITZ p. 1130, Taf. 284, Fig. 13—15	Buitenzorg [ZOLLINGER]
v. *moussoniana* .	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 230	Buitenzorg [ZOLLINGER]
(= *corrosa*) . . .	MOUSSON 1857, Journ. Conchyl. VI, p. 156	—
duplocincta	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 64	Java [FRUHSTORFER]
	KOBELT in MARTINI-CHEMNITZ, *Helix* p. 989, Taf. 256, Fig. 11 und 12	—
	diese Arbeit p. 206	Depok
humphreysiana . . .	LEA 1841, Trans. Americ. philos. Soc. Philad. VII, p. 483, Taf. 12, Fig. 16	—
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 233, Taf. 10, Fig. 3, 4, 6	Botan. Garten in Buitenzorg [TEYSMANN in Koll. MOUSSON]
	SCHEPMAN 1912, Proc. mal. Soc. X, p. 230	Nusa Kambangan
v. *turbinata*	v. MARTENS 1867, Ostas. Landmoll. p. 234	bei Sindang-laya oberhalb Buitenzorg [v. MARTENS]
	REEVE, Conch. Icon. Fig. 387	—
v. *complanata* . .	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 384, Taf. 10, Fig. 2	bei Adjibarang (Res. Banjuma) [JAGOR]
	BOETTGER 1890, Ber. Senckenb. Ges. p. 139 (= *gemina* v. d. BUSCH)	Gunung Salak
v. *gemina*	v. d. BUSCH in PHILIPPI Abt. I, p. 9, Taf. 1, Fig. 1	—
	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 16	—
	BOETTGER 1891, Ber. Senckenb. Ges. p. 242	Ostjava
(= *bifasciata*)	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 235	—
induta	PFEIFFER 1845, Proc. Zool. Soc. p. 128	—
	PFEIFFER in MARTINI-CHEMNITZ p. 541, Taf. 164, Fig. 7—9	Java [Koll. LÜDERS]
javana	FÉRUSSAC, Prodrom. Nr. 92 (= *javacensis*)	Java [LESCHENAULT]

Hemiplecta		
javana	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 215, Taf. 6, Fig. 5	Palabuan an der Wynkooperbai [v. MARTENS]; Solo bei Surakarta [Koll. MOUSSON]; bei Surabaya und Grisse [v. MARTENS]; bei der Jodquelle Genok-wati (Ostjava) [ZOLLINGER]
(= *umbilicaria*)	(nec GUILLOU) PFEIFFER, Monogr. I, p. 62	
	PFEIFFER in MARTINI-CHEMNITZ, *Helix* Taf. 11, Fig. 14 und 15	
marginata	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 64	Java [FRUHSTORFER]
	KOBELT in MARTINI-CHEMNITZ, *Helix* p. 988, Taf. 256, Fig. 7, 8	—
patens	v. MARTENS 1899, Archiv f. Naturg. 65, p. 27, Taf. 3, Fig. 1	Kawi Malang (Res. Pasuruan, östl. Java)
	SCHEPMAN 1912, Proc. mal. Soc. X, p. 230	Nongkodjadjar
umbilicaria	GUILLOU 1842, Rec. Zool. p. 137	—
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 214	—
(= *javanica*)	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 15, Taf. I, Fig. 3	—
v. *sundana*	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 215	bei Tjikoya (Res. Bantam) [ZOLLINGER], zwischen Kedivi und Modjokerta (östl. Java)
v. *virescens*	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 215	Wonosari im Tengergebirge und bei Rogodjampi (Res. Banjuwangi) [ZOLLINGER]
Dyakia		
clypeus	MOUSSON 1857, Journ. Conchyl. VI, p. 156	—
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 227	—
	PFEIFFER, Novit. Conchol. IV, p. 27, Taf. 115, Fig. 3—5	—
	SCHEPMAN 1912, Proc. mal. Soc. X, p. 231	Nongkodjadjar
	KOBELT in MARTINI-CHEMNITZ p. 991, Taf. 257, Fig. 1—3	—
	diese Arbeit p. 206	Buitenzorg
v. *zollingeriana*	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 227	auf dem Berge Smiru [ZOLLINGER]
v. *jagoriana*	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 227	zwischen Bantjar und Kaliputjang (Res. Banjuma) [JAGOR]
regalis	BENSON 1850, Ann. N. H.	fraglich
	PFEIFFER in MARTINI-CHEMNITZ, *Helix* Taf. 141, Fig. 5—8	—

Dyakia		
regalis	v. Martens 1867, Ostas. Landschn. p. 225	—
(= *vittata*)	Adams et Reeve, Moll. Samarang p. 60, Taf. 15, Fig. 7	–
rumphii	v. d. Busch in Philippi Abbild. I, p. 9, Taf. I, Fig. 2	—
	Pfeiffer in Martini-Chemnitz, *Helix* Taf. 11, Fig. 7—9	–
	Mousson 1849, Moll. Java p. 18, Taf. 1, Fig. 2	südl. Java
	v. Martens 1867, Ostas. Landschn. p. 220	westl. Java in Wäldern; am Berg Megamendong zwischen Buitenzorg und Tjandjor [v. Hasselt]; Buitenzorg [Zollinger, Teysmann]; bei Sindang-laya oberhalb Buitenzorg am Fuße des Vulkans Papandajang [v. Martens]; Regentschaft Inkapura (Preanger) [v. Richthofen]
	Schepman 1912, Proc. mal. Soc. X, p. 231	Gunung Gedeh; Gunung Ungaran
Xesta		
dwipana	Gude 1903, Proc. mal. Soc. V, p. 264, Taf. 7, Fig. 15—17	Passaroean
	Schepman 1912, Proc. mal. Soc. X, p. 230	Gunung Ungaran [Jacobson]; Gunung Gedeh [Fruhstorfer]
(= *jenynsi*)	(nec Pfeiffer) v. Martens 1867, Ostas. Landschn. p. 254	östl. Java bei Wonosari im Tengergebirge [Zollinger]
Trochonanina		
conus	Philippi Abbild. I, p. 11, Taf. 1, Fig. 6	—
	Pfeiffer in Martini-Chemnitz, *Helix* Taf. 28, Fig. 6, 7	—
	Mousson 1849, Moll. Java p. 20, Taf. 2, Fig. 2	Nusa-Baron (bei Java)
	v. Martens 1867, Ostas. Landschn. p. 253	auf dem Berge Megamendong zwischen Tjandjor u. Buitenzorg [v. Hasselt]
	Boettger 1890, Ber. Senckenb. Ges. p. 140	Gunung Salak
multicarinata	Boettger 1890, Ber. Senckenb. Ges. p. 141, Taf. 5, Fig. 2	Gunung Gedeh
	v. Martens 1891 in Weber, Ergebn. II, p. 232	Tjibodas [Weber]
	diese Arbeit p. 207	Tjibodas
Inozonites		
imitator	v. Moellendorff 1897, Nachrbl. 29, p. 65	Java [Fruhstorfer]

Microcystina		
infans	PFEIFFER 1854, Proc. Zool. Soc. p. 290.	—
	REEVE, Conch. Icon. Fig. 1417	—
	v. MARTENS 1867. Ostas. Landschn. p. 243	östl. Java: Wonosari im Tengergebirge [ZOLLINGER]
	BOETTGER 1891, Ber. Senckenb. Ges. p. 243	Gunung Gedeh [STRUBELL] Tengergebirge [Koll. BOETTGER]
	SCHEPMAN 1912, Proc. mal. Soc. X, p. 233	Nongkodjadjar
Lamprocystis		
circumlineata	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 62	Java [FRUHSTORFER]
exigua	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 63	Java [FRUHSTORFER]
fruhstorferi	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 62	Java [FRUHSTORFER]
gedeana	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 61	Java [FRUHSTORFER]
nana	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 63	Java [FRUHSTORFER]
	diese Arbeit p. 209	Buitenzorg
radiatula	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 63	Java [FRUHSTORFER]
subglobosa	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 62	Java [FRUHSTORFER]
vitreiformis	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 63	Java [FRUHSTORFER]
Sitala		
bandongensis	BOETTGER 1890, Ber. Senckenb. Ges. p. 141, Taf. 5, Fig. 3 (= *Geotroch. pellucidus*, v. HASSELT nach v. MARTENS 1891 in WEBER, Ergebn. II, p. 233)	Gunung Malabar
javana	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 58	Java [FRUHSTORFER]
micula	MOUSSON 1857, Journ. Conchyl. VI, p. 158	—
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 258	Buitenzorg [TEYSMANN]
tjibodasensis	diese Arbeit p. 207	Tjibodas
Kaliella		
acutiuscula	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 59	Java [FRUHSTORFER]
	diese Arbeit p. 208	Tjibodas
amblia	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 60	Java [FRUHSTORFER]
angigyra	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 60	Java [FRUHSTORFER]

Kaliella		
convexoconica	v. Moellendorff 1897, Nachrbl. 29, p. 60	Java [Fruhstorfer]
densetorta	v. Moellendorff 1897, Nachrbl. 29, p. 60	Java [Fruhstorfer]
javana	Boettger 1890, Ber. Senckenb. Ges. p. 142, Taf. 5, Fig. 4	Gunung Malabar
macrostoma	v. Moellendorff 1897, Nachrbl. 29, p. 61	Java [Fruhstorfer]
pisum	v. Moellendorff 1897, Nachrbl. 29, p. 61	Java [Fruhstorfer]
platyconus	v. Moellendorff 1896, Nachrbl. 28, p. 135	Java [Fruhstorfer]
	v. Moellendorff 1897, Nachrbl. 29, p. 59	—
sitaliformis	v. Moellendorff 1897, Nachrbl. 29, p. 59	Java [Fruhstorfer]
viridula	v. Moellendorff 1897, Nachrbl. 29, p. 61	Java [Fruhstorfer]
Trochomorpha		
bicolor	v. Martens 1864, Monatsber. Berlin. Akad. p. 267	
	v. Martens 1867, Ostas. Landschn. p. 252, Taf. 13, Fig. 2	im östl. Teil bei Wonosari im Tengergebirge [Zollinger in Koll. Mousson]
concolor	Boettger 1890, Ber. Senckenb. Ges. p. 143, Taf. 5, Fig. 6	Gunung Gedeh
hartmanni	Pfeiffer 1845, Proc. Zool. Soc. p. 125	Java (?)
	Pfeiffer in Martini-Chemnitz, *Helix* Taf. 91, Fig. 16—18	—
	v. Martens 1867, Ostas. Landschn. p. 248	—
lardea	v. Martens 1864, Monatsber. Berlin. Akad. p. 267	—
	v. Martens 1867, Ostas. Landschn. p. 251, Taf. 13, Fig. 5	bei Buitenzorg [Zollinger in Koll. Mousson]
planorbis	Lesson 1830, Coquill. Zool. II, p. 312, Taf. 13, Fig. 4	—
	Pfeiffer in Martini-Chemnitz, *Helix* Taf. 129, Fig. 16, 17	—
	v. Martens 1867, Ostas. Landschn. p. 249, Taf. 13, Fig. 4, 7, 8	
v. *javanica*	Mousson 1849, Moll. Java p. 25, Taf. 2, Fig. 9	Tjiringin
	v. Martens 1867, Ostas. Landschn. Taf. 13, Fig. 7	bei Tjiminjiu [v. Hasselt]; Java [Jagor]; Res. Banjuma
	Boettger 1890, Ber. Senckenb. Ges. p. 142	am Gunung Salak
	diese Arbeit p. 210	Tjibodas

Trochomorpha strubelli	BOETTGER 1890, Ber. Senckenb. Ges. p. 143, Taf. 5, Fig. 5	am Gunung Salak
	diese Arbeit p. 210	Tjompea
	(= *Geotrochus zonatus*, v. HASSELT Mskr., n. v. MARTENS 1891 in WEBER, Ergebn. II, p. 233)	Megamendong bei Buitenzorg
tricolor	v. MARTENS 1863, Malak. Blätter IX, p. 116, 134	—
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 252, Taf. 13, Fig. 3.	(?) Java [Koll. MOUSSON]
Pyramidula javana	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 65	Java [FRUHSTORFER]
Trichochloritis crassula	PHILIPPI, Abb. I, p. 152, Taf. 5, Fig. 3	Java
	PFEIFFER in MARTINI-CHEMNITZ, *Helix* p. 251, Taf. 114, Fig. 14—16	—
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 276	Wonosari im Tengergebirge [Koll. MOUSSON]; (?) Buitenzorg [Koll. MOUSSON]
	BOETTGER 1890, Ber. Senckenb. Ges. p. 144, Taf. 5, Fig. 7	am Gunung Salak
	BOETTGER 1891, Ber. Senckenb. Ges. p. 244	Gunung Gedeh
	SCHEPMAN 1912, Proc. mal. Soc. X, p. 233	Gunung Gedeh
	diese Arbeit p. 210	Tjompea
fruhstorferi	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 68	Java [FRUHSTORFER]
helicinoides	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 23, Taf. 2, Fig. 6	Tjiringin
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 270	Bantam [Koll. MOUSSON]; Anjer [v. MARTENS]
tetragyra	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 68	Java [FRUHSTORFER]
transversalis	MOUSSON 1857, Journ. Conchyl. VI, p. 158, Taf. 6, Fig. 5	—
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 273	Madura (bei Sumanap) [ZOLLINGER]
Amphidromus albicola	(BOETTGER Mskr.) FULTON 1896, Ann. N. H. (6), XVII, p. 70, Taf. 6, Fig. 5	Java
	PILSBRY, Man. Conchol. XIII, p. 147, Taf. 53, Fig. 75, 76	
filizonatus	(MOUSSON i. coll.) v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 358, Taf. 21, Fig. 4	bei Grisse unweit Surabaja [v. MARTENS]; Insel Madura [ZOLLINGER]

Amphidromus		
filizonatus	PILSBRY, Man. Conchol. XIII, p. 202, Taf. 64, Fig. 4	—
furcillatus	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 115	Insel Bimah [ZOLLINGER]
(= *elegans*)	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 32, Taf. 3, Fig. 3	Pangang-Lele, in Kaffeepflanzungen [ZOLLINGER]
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 357, Taf. 21, Fig. 3	bei Litjin und Rogodjampi (Res. Banjuwangi) [ZOLLINGER]; am Berg Lamongan (Res. Probolingo) [JAGOR]; Dorf Balong (Distrikt Djember, Res. Bezuki) [SEMMELINK]
	PILSBRY, Man. Conchol. XIII, p. 216, Taf. 66, Fig. 38—40	—
	v. MARTENS 1899, Archiv f. Naturg. LXV, p. 28	Kawi Malang (östl. Java, Res. Pasuruan)
	SCHEPMAN 1912, Proc. mal. Soc. X, p. 234	Nongkodjadjar [JACOBSON]
heerianus	(MOUSSON Mskr.) PFEIFFER 1871, Novit. Conchol. IV, p. 31, Taf. 116, Fig. 4	—
	v. MARTENS 1873, Malak. Blätter XX, p. 154	
v. *robustus*	FULTON 1896, Ann. N. H. (6), XVII, p. 73	—
	(= *winteri* gebändert: v. MARTENS, Ostas. Landschn. p. 354, Taf. 20, Fig. 4)	Bandjar in Banjumas [JAGOR]
interruptus	MÜLLER 1774, Verm. terr. et fluv. II, p. 94	—
	(= *interruptus sultana*, MOUSSON 1849, Java p. 31, Taf. IV, Fig. 1, 2	bei Puger auf Nusa Baron
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 344, Taf. XX, Fig. 1—3, 6, 8, 9	Pardana (Res. Bantam, westl. Java), Rogodjampi (Res. Banjumas) [ZOLLINGER]; Surabaja [v. MARTENS]
	PILSBRY, Man. Conchol. XIII, p. 150, Taf. 52, Fig. 53—56	—.
subsp. *emaciatus*	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 347, Taf. 20, Fig. 7	Grisse b. Surabaja [v. MARTENS]
	PILSBRY, Man. Conchol. XIII, p. 153, Taf. 53, Fig. 77, 78	Donerang (Koll. A. N. S.)
subsp. *sultana*	LAMARCK 1819, Ann. s. vert. VI, pt. 2, p. 119	Java [LESCHENAULT]
	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 106 (*interruptus* var. *flammea*)	—
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 342, Taf. 22, Fig. 1, 3, 4	bei Rogodjampi in Banjumas (mittl. Java); Banjuwangi (mittl. Java) [ZOLLINGER]

Amphidromus interruptus subsp. *sultana* ..	PILSBRY, Man. Conchol. XIII, p. 154, Taf. 53, Fig. 66—74	—
javanicus	SOWERBY 1841, Conchol. Illustr. Bulimus p. 6, Fig. 35	Java
	PILSBRY, Man. Conchol. XIII, p. 140, Taf. 61, Fig. 50, 51	—
(= *loricatus*	PFEIFFER 1854. Proc. Zool. Soc. p. 293	-
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 339, Taf. 22, Fig. 2	bei Palabuan (Südwestjava)
palaceus	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 28, 108, Taf. 3, Fig. 1	Pardana und Tjikoya unter Kaffeebäumen [ZOLLINGER]
	v. MARTENS 1867. Ostas. Landschn. p. 352	Palabuan (Südwestküste) [v. MARTENS]
	PILSBRY, Man. Conchol. XIII, p. 134, Taf. 47, Fig. 1, 2, 4—6	
v. *purus*.....	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 29, Taf. 3, Fig. 2	Hakka (Prov. Probolingo); Pardana [ZOLLINGER]
	PILSBRY, Man. Conchol. XIII. p. 135, Taf. 47, Fig. 3	
v. *appressus*	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 353	Java [ZOLLINGER]
	BOETTGER 1890, Ber. Senckenb. Ges. p. 145, Taf. 5, Fig. 8	am Gunung Gedeh
	PILSBRY, Man. Conchol. XIII, p. 136, Taf. 47, Fig. 7; Taf. 46, Fig. 15	—
	diese Arbeit p. 213	Tjibodas
v. *tener*	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 350 (als *perversus* var.)	fraglich
	PILSBRY, Man. Conchol. XIII, p. 136, Taf. 46, Fig. 16—18	Java
perversus	LINNÉ 1758, System. Natur. X, p. 772	
	MOUSSON 1829, Moll. Java p. 28, Taf. 22, Fig. 5	Java
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 349, Taf. 20, Fig. 13 (= *p. aureus*)	
	BOETTGER 1890, Ber. Senckenb. Ges. p. 146	an den Ausläufern des Gunung Gedeh
	BOETTGER 1891. Ber. Senckenb. Ges. p. 244	am Gunung Gedeh
	PILSBRY, Man. Conchol. XIII, p. 147, Taf. 51, Fig. 47—52	—
porcellanus	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 33, 110, Taf. 3, Fig. 4	Java
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landmoll. p. 365	bei Warong Kapangdangan (westl. Java) [v. HASSELT]

Amphidromus		
porcellanus	BOETTGER 1890, Ber. Senckenb. Ges. p. 146	Buitenzorg [STRUBELL]
	v. MARTENS in WEBER, Ergebn. II, p. 241	Buitenzorg [WEBER]
	PILSBRY, Man. Conchol. XIII, p. 201, Taf. 64, Fig. 5—7	—
	diese Arbeit p. 213	Buitenzorg
winteri	PFEIFFER 1849, Zeitschr. Malak. p. 135	Java [WINTER]
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 353, Taf. 20, Fig. 4, 10; Taf. 21, Fig. 12	Tjikoya, Pardana u. Hakka (Res. Probolingo) [ZOLLINGER]; Tjisurupan [v. MARTENS]; Bandjar in Banjumas [JAGOR]
	PILSBRY, Man. Conchol. XIII, p. 137, Taf. 48, Fig. 13—15	—
subsp. *inauris* ..	FULTON 1896, Ann. N. H. (6), XVII, p. 74	Java [FRUHSTORFER]
Pseudopartula		
galericulum	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 34, Taf. 3, Fig. 5	Gegend von Pardana
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 324	Java [JUNGHUHN]
	BOETTGER 1890, Ber. Senckenb. Ges. p. 146	Gunung Salak
	PILSBRY, Man. Conchol. XIV, p. 10, Taf. 2, Fig. 31—33	—
	SCHEPMAN 1912, Proc. mal. Soc. X, p. 234	Nongkodjadjar [JACOBSON]
v. *gedeana*	PILSBRY, Nautilus X, p. 110	—
v. *fasciata*	ANCEY 1898, Ann. Mus. Hist. Nat. Marseille (2) Bull. 1, p. 147	Westjava
v. *impunctata* ...		
Ganesella		
bantamensis	SMITH 1887, Ann. N. H. (5) XX, p. 132	Bantam
	PILSBRY, Man. Conchol. VII, p. 84, Taf. XVIII, Fig. 51	—
Eulota		
similaris	FÉRUSSAC 1821, Prodrom. Nr. 262	—
	MOUSSON 1849, Moll. Java, p. 21, Taf. 2, Fig. 4, 5	Tjikoya, aber auch an anderen Orten [ZOLLINGER]
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 270	—
	v. MARTENS in WEBER, Ergebn. II, p. 236	Tjibodas [WEBER]
v. *subdepressa* ...	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 271	—
(= *fragilis*) ..	MOUSSON 1849, Moll. Java Taf. 2, Fig. 5	bei Tjikoya und Tjiringin (Res. Bantam) [ZOLLINGER]

Eulota similaris		
v. *solidula*	MOUSSON 1849, Moll. Java Taf. 2, Fig. 4	—
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 271	bei Sindang-laya (oberhalb Buitenzorg) und bei Tjisurupan (oberhalb Bandong) [v. MARTENS]
v. *subsimilaris* ..	MOUSSON, v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 271	Java [Koll. MOUSSON]
	BOETTGER 1890, Ber. Senckenb. Ges. p. 144	Gunung Malabar [STRUBELL]; Buitenzorg [SCHEPMAN]
	diese Arbeit p. 210	Tjibodas
transversalis	MOUSSON 1857, Journ. Conchyl. VI, p. 158, Taf. 6, Fig. 5	Insel Madura (östl. Hälfte), bei Sumanap [ZOLLINGER]
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 273	—
Plectotropis		
ciliocincta	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 67	Java [FRUHSTORFER]
conoidea	diese Arbeit p. 212	Buitenzorg
epiplatia	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 67	Java [FRUHSTORFER]
huttoni	PFEIFFER 1842, Symbolae II, p. 82	—
	MARTINI-CHEMNITZ *Helix* Taf. 144, Fig. 9, 10	—
(= *orbicula*)	HUTTON nec. Orb. v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 267	Java [ZOLLINGER]
intumescens	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 263, Taf. 13, Fig. 10	bei Surabaja und Grisse (östl. Java) [v. MARTENS]; im Tengergebirge bei Wonosari [ZOLLINGER]
	v. MARTENS 1891 in WEBER, Ergebn. II, p. 234	—
kraepelini	diese Arbeit p. 211	Tjibodas
leucochila	GUDE 1905, Journ. Malac. XII, p. 14, Taf. 3, Fig. 1	Java
leucomphala	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 66	Java [FRUHSTORFER]
rotatoria	(v. D. BUSCH) in PHILIPPI, Abb. I, p. 10, Taf. 1, Fig. 5	Java [WINTER]
	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 24, Taf. 2, Fig. 8	auf Pflanzen des Eilands Popoli bei Tjiringin [ZOLLINGER]
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 264	bei Tjisurupan in Preanger [v. MARTENS]; Java [KUHL und v. HASSELT]
	v. MARTENS 1891 in WEBER, Ergebn. II, p. 234	Tjibodas

Plectotropis		
schepmani	v. Moellendorff 1897, Nachrbl. 29, p. 68	Java [Fruhstorfer]
smiruensis	Mousson 1849, Moll. Java p. 21, Taf. 2, Fig. 10	auf dem Berge Smiru (östl. Java) [Zollinger]
	Mousson 1849, Zeitschr. Malak. p. 177	
	v. Martens 1867, Ostas. Landschn. p. 268	östl. Java [Jagor]
sumatrana	v. Martens 1867, Ostas. Landschn. p. 266, Taf. 13, Fig. 13	—
v. *moussoniana*	v. Martens 1867, Ostas. Landschn. p. 266	im Tengergebirge bei Wonosari [Zollinger]
	diese Arbeit p. 211	Buitenzorg, Tjibodas, Tjompea
tenggerica	Schepman 1912, Proc. mal. Soc. X, p. 233, Taf. 10, Fig. 9—11	Nongkodjadjar
trichotrochium	v. Moellendorff 1897, Nachrbl. 29, p. 67	Java [Fruhstorfer]
winteriana	Pfeiffer 1842, Symbolae II, p. 41	Java [Winter]
	Philippi, Abb. I, p. 23, Taf. 2, Fig. 7	—
	Mousson 1849, Moll. Java p. 23, Taf. 2, Fig. 7; Taf. 20, Fig 2	Java [Zollinger]
	v. Martens 1867, Ostas. Landschn. p. 264, Taf. 13, Fig. 11	Java [Junghuhn]; Buitenzorg [Zollinger]
Crystallopsis		
coelaxis	Pilsbry 1891, Man. Conchol. VII, p. 114, Taf. 26, Fig. 6—8	Java [Koll. A. D Brown]
Acanthinula		
perpusilla	v. Moellendorff 1897, Nachrbl. 29, p. 66	Java [Fruhstorfer]
tiluana	v. Moellendorff 1897, Nachrbl. 29, p. 66	Java [Fruhstorfer]
Buliminus (Coccoderma)		
glandula	Mousson 1849, Moll. Java, p. 34, Taf. 4, Fig. 3	südl. Java auf Sträuchern [Zollinger]
	v. Martens 1867, Ostas. Landschn. p. 370	Sumenap auf Madura [Zollinger]
	Kobelt in Martini-Chemnitz, *Buliminus* p. 885, Taf. 126, Fig. 17, 18	—
v. *camarota*	(v. Moellendorff Mskr) Kobelt in Martini-Chemnitz. *Buliminus* p. 886, Taf. 126, Fig. 19 und 20	Tengergebirge [Fruhstorfer]
prillwitzi	v. Moellendorff 1897, Nachrbl. 29, p. 69	Java [Fruhstorfer]
	Kobelt in Martini-Chemnitz, *Buliminus* p. 900, Taf. 128, Fig. 16, 17	Gunung Gedeh, 3000 Fuß

Buliminus (Coccoderma)		
tenggericus	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 69	Java [FRUHSTORFER]
	KOBELT in MARTINI-CHEMNITZ, *Buliminus* p. 888, Taf. 126, Fig. 25, 26	Tengergebirge bei 1200 Fuß
tenuiliratus	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 69	Java [FRUHSTORFER]
	KOBELT in MARTINI-CHEMNITZ, *Buliminus* p. 539, Taf. 85, Fig. 6 und 7	—
thraustus	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 70	Java [FRUHSTORFER]
	KOBELT in MARTINI-CHEMNITZ, *Buliminus* p. 887, Taf. 126, Fig. 21, 22	—
? vestalis	(MOUSSON ined.) v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 370	bei Buitenzorg [ZOLLINGER]
Prosopeas		
achatinaceum	PFEIFFER, Symbolae III, p. 82	—
	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 35, Taf. 4, Fig. 4	Pardana [ZOLLINGER]
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 375, Taf. 22, Fig. 9	—
	PILSBRY, Man. Conchol. XVIII, p. 21, Taf. 5, Fig. 40, 41	—
	diese Arbeit p. 214	Buitenzorg
acutissimum	MOUSSON 1857, Journ. Conchyl. VI, p. 159	Buitenzorg (Botan. Garten)
	v. MARTENS 1891 in WEBER, Ergebn. II, p. 243	Buitenzorg [WEBER]
	BOETTGER 1890, Ber. Senckenb. Ges. p. 147	Gunung Salak
	PILSBRY, Man. Conchol. XVIII, p. 22, Taf. III, Fig. 85—88	—
v. *hastatum* . . .	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 72	Java [FRUHSTORFER]
	PILSBRY, Man. Conchol. XVIII, p. 23, Taf. III, p. 89—91	—
hochstetteri	ZELEBOR 1867, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVII, p. 806	Java (wahrscheinl. Buitenzorg) [Navara-Expedition]
holosericum	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 72	Java [FRUHSTORFER]
	PILSBRY, Man. Conchol. XVIII, p. 24, Taf. III, Fig. 93, 94	
Opeas		
arctispira	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 374	bei Anger an der Sundastraße [v. MARTENS]; Buitenzorg [ZOLLINGER]

Opeas		
arctispira	PILSBRY, Man. Conchol. XVIII, p. 175, Taf. 19, Fig. 25	—
curvicosta	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 89	Java [FRUHSTORFER]
densespiratum	MOUSSON 1857, Journ. Conchyl. VI, p. 159	bei Buitenzorg [ZOLLINGER]
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 374	—
	PILSBRY, Man. Conchol. XVIII, p. 174	—
gracile	HUTTON 1834, Journ. Asiat. Soc. Beng. p. 93 und p. 84	—
(= *apex*)	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 35, Taf. 4, Fig. 5	Pardana [ZOLLINGER]
	MOUSSON 1849, Zeitschr. Malak. p. 180	Sumenap auf Madura [ZOLLINGER]
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 375	—
	PILSBRY, Man. Conchol. XVIII, p. 125, Taf. 18, Fig. 3—6	—
javanicum	REEVE 1849, Conch. Icon. V, Taf. 17, Fig. 79	Java
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 377, Taf. 22, Fig. 11	Wonosari (östl. Java) [ZOLLINGER]
Subulina		
octona	BRUGUIÈRE 1792, Encyclop. méthod. I, p. 325	—
	BOETTGER 1890. Ber. Senckenb. Ges. p. 147	Gunung Salak [STRUBELL]
	diese Arbeit p. 214	Buitenzorg
Glessula		
cornea	BOETTGER 1890, Ber. Senckenb. Ges. p. 148, Taf. 5, Fig. 9	Gunung Salak [STRUBELL]
	= *cornea* v. HASSELT Mskr. bei	
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 372	Gunung Salak
	BOETTGER 1891, Ber. Senckenb. Ges. p. 244	Gunung Salak
Boysidia		
boettgeri	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 70	Java [FRUHSTORFER]
Hypselostoma		
fruhstorferi	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 70	Java [FRUHSTORFER]
Phaedusa		
cornea	PHILIPPI in PFEIFFER, Symbolae III, p. 63	in Gebirgen der Insel Java [JUNGHUHN]
	KÜSTER in MARTINI-CHEMNITZ, *Clausilia* p. 22, Taf. 2, Fig. 1—4	—

Phaedusa		
cornea	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 383	—
corticina	v. D. BUSCH in PFEIFFER, Symbolae II, p. 60	Java [WINTER]
	KÜSTER in MARTINI-CHEMNITZ, *Clausilia* p. 26, Taf. 1, Fig. 24	—
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 381	—
fruhstorferi	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 72	Java [FRUHSTORFER]
heldii	KÜSTER in PFEIFFER, Symbolae III, p. 63	Java
	KÜSTER in MARTINI-CHEMNITZ, *Clausilia* p. 27, Taf. 2, Fig. 29—31	—
	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 39	—
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 380	—
v. *baronensis*	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 39, Taf. 4, Fig. 7	Nusa Baron
javana	PFEIFFER, Symbolae I, p. 49	Java [WINTER]
	KÜSTER in MARTINI-CHEMNITZ, *Clausilia* p. 26, Taf. 2, Fig. 26 bis 28	—
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 386, Fig. 2	Java [v. HASSELT]
	BOETTGER 1890, Ber. Senckenb. Ges. p. 148	Gunung Salak und Gedeh [STRUBELL]
junghuhni	PHILIPPI bei PFEIFFER, Symbolae III, p. 63	in den Gebirgen von Java [JUNGHUHN]
	KÜSTER in MARTINI-CHEMNITZ, *Clausilia* p. 23, Taf. 2, Fig. 5—7	—
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 383	—
	BOETTGER 1890, Ber. Senckenb. Ges. p. 149	Gunung Malabar
moritzii	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 41, Taf. 4, Fig. 8	Nusa Baron
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 383	—
nubigena	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29. p. 71	Java [FRUHSTORFER]
orientalis	v. D. BUSCH in PFEIFFER, Symbolae II, p. 60	Java [WINTER]
	KÜSTER in MARTINI-CHEMNITZ, *Clausilia* p. 25, Taf. 2, Fig. 17—19	
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 383	Java [GÖRING]
salacana	BOETTGER 1890, Ber. Senckenb. Ges. p. 149, Taf. 6, Fig. 2	Gunung Salak

Tornatellina		
sundana	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 90	Java [FRUHSTORFER]
Carychium		
javanum	v. MOELLENDORFF 1897. Nachrbl. 29. p. 90	Java [FRUHSTORFER]
Georissa		
javana	v. MOELLENDORFF 1897. Nachrbl. 29, p. 97	Java [FRUHSTORFER]
laeviuscula	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 27, p. 97	Java [FRUHSTORFER]
Succinea		
gracilis.....	LEA 1841, Proc. amer. philos. Soc. II, p. 31	Java (?)
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 387	—
javanica.....	SCHEPMAN 1912, Proc. mal. Soc. X, p. 235, Taf. 10, Fig. 12, 13	Tuntang River
obesa	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 387, Taf. 22, Fig. 21	See von Grati bei Passuruan [v. MARTENS]
Vaginula		
austeni.....	SIMROTH bei v. MARTENS 1891 in WEBER, Ergebn. II, p. 246	Buitenzorg [WEBER]
bleekeri.....	KEFERSTEIN 1863, Zeitschr. f. wiss. Zool. XV, p. 127, Taf. 9, Fig. 1 und 2	Java [BLEEKER]
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 177	—
cockerelli	SIMROTH 1892, Sitzungsber. Ges. Leipzig XVIII, p. 69 u. 85	Buitenzorg [WEBER]
maculosus	(v. HASSELT Mskr.) FÉRUSSAC Hist. Nat. Taf. 8e, Fig. 9, Vol. II, p. 96	—
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 177	westl. Java bei Tjihanjavar, 1000—1400 Fuß [v. HASSELT]
marshalli	SIMROTH 1892, Sitzungsber. Ges. Leipzig XVIII, p. 68 u. 85	Java [STRUBELL]
newtoni	SIMROTH 1892, Sitzungsber. Ges. Leipzig XVIII, p. 68 u. 85	Java [STRUBELL]
platei	SIMROTH 1892, Sitzungsber. Ges. Leipzig XVIII, p. 68 u. 85	Java [STRUBELL]
punctatus	(v. HASSELT Mskr.) FÉRUSSAC Hist. Nat. Taf. 8e, Fig. 7	—
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 177	westl. Java, in der Nähe von Buitenzorg, 1000—1400 Fuß [v. HASSELT]
strubelli	SIMROTH 1892, Sitzungsber. Ges. Leipzig XVIII, p. 67, 69, 85	Java [STRUBELL]; Buitenzorg [WEBER]
	v. MARTENS 1891 in WEBER, Ergebn. II, p. 247	Buitenzorg [WEBER]

Vaginula strubelli	SIMROTH 1898, Abh. Senckenb. Ges. XXIV, p. 137, Taf. 14, Fig. 9	bei Buitenzorg [KÜKENTHAL]
	SCHEPMAN 1912, Proc. mal. Soc. X, p. 234	Samarang
viridialbus	(v. HASSELT Mskr.) v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 177	westl. Java; bei Kapangdangan, 1000—1400 Fuß [v. HASSELT]
Leptopoma altum	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 90	Java [FRUHSTORFER]
	KOBELT in Tierreich XVI, p. 27	–
	KOBELT in MARTINI-CHEMNITZ, Cycloph. p. 471, Taf. 58, Fig. 16 bis 18	
mouhoti	PFEIFFER 1861, Proc. Zool. Soc. p. 195	—
	REEVE, Conch. Icon. XIII, p. 25	–
	KOBELT in Tierreich XVI, p. 26	Weihnachtsinsel bei Java (eine Varietät)
moussoni	v. MARTENS 1865, Monatsber. Berl. Akad. p. 52	–
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 147, Taf. 2, Fig. 10	bei Kurissan (Kuripan?) auf vulkanisch. Kalkboden [ZOLLINGER]
	KOBELT in Tierreich XVI, p. 26	—
	KOBELT in MARTINI-CHEMNITZ, Cycloph. p. 441, Taf. 55, Fig. 2	-
vitreum	LESSON 1830, Coquille II, p. 346, Taf. 13, Fig. 6	—
	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 57, Taf. 6, Fig. 45	von Kurissan auf Java
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 143, Taf. 4, Fig. 2, 4, 6	östl. Java: Wonosari und Banjuwangi [ZOLLINGER]
	KOBELT in Tierreich XVI, p. 15	—
	KOBELT in MARTINI-CHEMNITZ, Cycloph. p. 406, Taf. 51, Fig. 11 bis 15	—
whiteheadi	SMITH 1887, Ann. N. H. (5) XX, p. 133	bei Bantam
	SMITH 1887, Ann. Soc. mal. Belgique XXII, p. 221, Taf. 9, Fig. 12, 13	—
	KOBELT in Tierreich XVI, p. 33	—
	KOBELT in MARTINI-CHEMNITZ, Cycloph. p. 448, Taf. 55, Fig. 13, 14	—
Japonia (Lagochilus) cilifera	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 56, Taf. 7, Fig. 3	Java [ZOLLINGER]
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 139	Java [JUNGHUHN]; bei Rogodjampi [v. MARTENS]; Bandong in Preanger [SMIT]

Japonia (Lagochilus)		
cilifera	BOETTGER 1890. Ber. Senckenb. Ges. p. 158	Gunung Salak
	KOBELT in Tierreich XVI, p. 39	—
	KOBELT in MARTINI-CHEMNITZ, Cycloph. p. 547, Taf. 68, Fig. 11 bis 17	—
ciliocincta	v. MARTENS 1865, Monatsber. Berl. Akad. p. 52	—
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 142, Taf. 2, Fig. 2	bei Palabuan (Südwestküste) [v. MARTENS]
	KOBELT in Tierreich XVI, p. 39	—
	KOBELT in MARTINI-CHEMNITZ, Cycloph. p. 529, Taf. 66, Fig. 9 und 10	—
convexa	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 90	Java [FRUHSTORFER]
	KOBELT in Tierreich XVI, p. 40	—
v. *palabuana*	v. MOELLENDORFF 1897. Nachrbl. 29, p. 91	Palabuan [FRUHSTORFER]
grandipila	BOETTGER, 1891, Ber. Senckenb. Ges. p. 249	—
(= *longipila*)	BOETTGER (nec v. MOELLENDORFF 1884) 1890, Ber. Senckenb. Ges. p. 159, Taf. 6, Fig. 9	Gunung Salak [STRUBELL]
	KOBELT in Tierreich XVI, p. 43	—
	KOBELT in MARTINI-CHEMNITZ, Cycloph. p. 513, Taf. 64, Fig. 11, 12	—
humile	v. MOELLENDORFF 1897. Nachrbl. 29. p. 91	Java [FRUHSTORFER]
	KOBELT in Tierreich XVI, p. 45	—
	KOBELT in MARTINI-CHEMNITZ, Cycloph. p. 555, Taf. 69, Fig. 19, 20	—
macromphalum	v. MOELLENDORFF 1897. Nachrbl. 29, p. 91	Java [FRUHSTORFER]
	KOBELT in Tierreich XVI, p. 48	—
	KOBELT in MARTINI-CHEMNITZ, Cycloph. p. 550, Taf. 69, Fig. 1—5	
obliquistriata	BULLEN 1904, Proc. mal. Soc. VI, p. 110, Taf. 6, Fig. 4, 5	Java
v. *depressa*	diese Arbeit p. 214	Depok
trochiformis	SCHEPMAN 1912, Proc. mal. Soc. X, p. 237, Taf. 10, Fig. 14—16	Gunung Ungaran
trochulus	v. MARTENS 1867. Ostas. Landschn. p. 141	Java [JUNGHUHN]; westlicher und nördlicher Teil bei Buitenzorg und Wonosari im Tengergebirge [ZOLLINGER]
	BOETTGER 1890, Ber. Senckenb. Ges. p. 159	Gunung Salak
	KOBELT in Tierreich XVI, p. 57	—

Japonia (Lagochilus)		
trochulus	KOBELT in MARTINI-CHEMNITZ, Cycloph. p. 551, Taf. 69, Fig. 6—8	—
v. *olivacea*	(BOETTGER Mskr.) KOBELT in MARTINI-CHEMNITZ, Cycloph. p. 552, Taf. 69, Fig. 9, 10	—
Ditropis		
fruhstorferi	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 92	Java [FRUHSTORFER]
	KOBELT in Tierreich XVI, p. 75	—
Cyclophorus		
(Glossostylus)		
eximius	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 53, Taf. 7, Fig. 1	? Java [ZOLLINGER]
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 131	? Malang im östl. Teil [SMIT]
	KOBELT in Tierreich XVI, p. 111	—
rafflesi	BRODERIP et SOWERBY 1829, Zool. J. V, p. 50	—
(= *oculuscapri*)	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 52, Taf. 6, Fig. 2	südl. Java [ZOLLINGER]
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 132	am Berg Salak südl. Buitenzorg [v. HASSELT]; zwischen Bandjar und Kaliputjang; Kalkfelsen von Jalantecha auf Nusa Kumbang (Südküste) [JAGOR]; bei Sindang-laya oberhalb Buitenzorg und Südküste bei Palabuan [v. MARTENS]
	BOETTGER 1890. Ber. Senckenb. Ges. p. 161	Buitenzorg, Gunung Salak
	KOBELT in Tierreich XVI, p. 117	
	KOBELT in MARTINI-CHEMNITZ, Cycloph. p. 676, Taf. 99, Fig. 1 bis 6	—
v. *decarinata* .	BOETTGER 1890. Ber. Senckenb. Ges. p. 161	Gunung Salak
(Salpingophorus)		
perdix	BRODERIP et SOWERBY 1830, Zool. J. V, p. 50	—
	MOUSSON 1849. Moll. Java p. 54, Taf. 8, Fig. 1	Java
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 136	Pardana [ZOLLINGER]; Buitenzorg [v. HASSELT und TEYSMANN]; Sindang-laya und Palabuan [v. MARTENS]; bei Adjibarang und Bandjar [JAGOR]; bei Banjuwangi und Rogodjampi [ZOLLINGER]

Cyclophorus (Salpingophorus) perdix	BOETTGER 1890, Ber. Senckenb. Ges. p. 160	Gunung Salak und Gedeh
	KOBELT in Tierreich XVI, p. 131	—
zollingeri	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 55, Taf. 7, Fig. 2	Java
	BOETTGER 1891, Ber. Senckenb. Ges. p. 256	Tengergebirge
	KOBELT in Tierreich XVI, p. 135	—
	KOBELT in MARTINI-CHEMNITZ, Cycloph. p. 694, Taf. 103, Fig. 9 bis 13	—
Pterocyclus sluiteri	BOETTGER 1890, Ber. Senckenb. Ges. p. 161 Taf. 6, Fig. 10	Gunung Gedeh
	KOBELT in Tierreich XVI, p. 169	—
	KOBELT in MARTINI-CHEMNITZ, Cycloph. p. 721, Taf. 104, Fig. 11 bis 13	—
Cyclotus (Pseudocyclophorus) discoideus	SOWERBY 1843, Thesaurus I, p. 111, Taf. 25, Fig. 87, 88	—
	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 50	Gegend von Malang
	v. MARTENS 1867, Ostas. Moll. p. 124	Palabuan (Südwestküste) [v. MARTENS; bei Bandjar (Res. Banjuma) [JAGOR]
	BOETTGER 1890, Ber. Senckenb. Ges. p. 161	Gunung Salak
	KOBELT in Tierreich XVI, p. 190	—
(= *opalinum*)	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 51, Taf. 5, Fig. 12	Wälder im Süden von Malang
(Opisthoporus) corniculum	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 51, Taf. 5, Fig. 11	aus den Kaffeepflanzungen von Pardana
	v. MARTENS 1867, Ostas. Moll. p. 112	bei Sindang-laya im Buitenzorgischen [v. MARTENS]; Buitenzorg [v. HASSELT]; Wonosari im Tengergebiet [ZOLLINGER]; Java [JUNGHUHN]
	BOETTGER 1890, Ber. Senckenb. Ges. p. 161	Gunung Salak
(= *javanus*)	PFEIFFER 1860, Malak. Blätter VII, p. 215, Taf. 3, Fig. 8—10	auf dem Berge Nungnang [HOCHSTETTER]
	KOBELT in Tierreich XVI, p. 214	—
	KOBELT in MARTINI-CHEMNITZ, Cycloph. p. 840, Taf. 124, Fig. 16 bis 18	—

Cyclotus (Pseudocyclophorus) biciliatus	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 49, Taf. 20, Fig. 9	im Blatt einer Nepenthes im botanischen Garten zu Buitenzorg (wohl aus Borneo eingeschleppt)
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 110	
	KOBELT in Tierreich XVI, p. 213	–
	KOBELT in MARTINI-CHEMNITZ, Cycloph. p. 835, Taf. 124, Fig. 19 und 20	
Pupina (Tylotoechus) bipalatalis	BOETTGER 1890, Ber. Senckenb. Ges. p. 156, Taf. 6, Fig. 6	Gunung Gedeh
	KOBELT in Tierreich VI, p. 309	–
compacta	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 92	Java [FRUHSTORFER]
	KOBELT in Tierreich XVI, p. 310	
junghuhni	(HERKLOTS Mskr.) v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 156	Java [JUNGHUHN]
	KOBELT in Tierreich XVI, p. 316	
succinacia	BOETTGER 1890, Ber. Senckenb. Ges. p. 157, Taf. 6, Fig. 7	Gunung Salak
	KOBELT in Tierreich XVI, p. 322	
treubi	BOETTGER 1890, Ber. Senckenb. Ges. p. 157, Taf. 6, Fig. 8	Gunung Salak und Gedeh
	KOBELT in Tierreich XVI, p. 324	
	diese Arbeit p. 215	Tjibodas
verbecki	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 92	Java [FRUHSTORFER]
	KOBELT in Tierreich XVI, p. 324	
Alycaeus crenilabris	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 93	Java [FRUHSTORFER]
	KOBELT in Tierreich XVI, p. 343	
hochstetteri	PFEIFFER 1860, Malak. Blätter VII, p. 215. Taf. 3, Fig. 1—4	in den Bergen von Nungnang [HOCHSTETTER]
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 152	
	KOBELT in Tierreich XVI, p. 345	
jagori	PFEIFFER 1860, Malak. Blätter VI, p. 208; VII, Taf. 7, Fig. 5—7	Java [JAGOR]
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 152	–
	KOBELT in Tierreich XVI, p. 346	
reticulatus	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 93	Java [FRUHSTORFER]
	KOBELT in Tierreich XVI, p. 349	–

Alycaeus		
(Chamalycaeus)		
fruhstorferi	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 93	Java [FRUHSTORFER]
	KOBELT in Tierreich XVI, p. 356	—
Palaina		
gedeana	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 94	Java [FRUHSTORFER]
	KOBELT in Tierreich XVI, p. 399	—
nubigena	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 94	Java [FRUHSTORFER]
	KOBELT in Tierreich XVI, p. 402	—
Diplommatina		
(Pseudopalaina)		
sulcicollis	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 94	Java [FRUHSTORFER]
	KOBELT in Tierreich XVI, p. 455	—
(Sinica)		
auriculata	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 95	Java [FRUHSTORFER]
	KOBELT in Tierreich XVI, p. 456	—
	diese Arbeit p. 215	Tjibodas
calcarata	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 94	Java [FRUHSTORFER]
	KOBELT in Tierreich XVI, p. 458	—
cyclostoma	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 95	Java [FRUHSTORFER]
	KOBELT in Tierreich XVI, p. 462	—
hortulana	diese Arbeit p. 215	Buitenzorg
javana	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 97	Java [FRUHSTORFER]
	KOBELT in Tierreich XVI, p. 465	—
perpusilla	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 96	Java [FRUHSTORFER]
	KOBELT in Tierreich XVI, p. 470	—
planicollis	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 96	Java [FRUHSTORFER]
	KOBELT in Tierreich XVI, p. 470	—
tetragonostoma ..	v. MOELLENDORFF 1897, Nachrbl. 29, p. 96	Java [FRUHSTORFER]
	KOBELT in Tierreich XVI, p. 475	—
Helicina (Geophorus)		
biconica	(MOUSSON in litt.) MARTENS 1867 Ostas. Landschn. p. 169	bei Buitenzorg [ZOLLINGER] vielleicht eingeschleppt
oxytropis	GRAY Zool. BEECHEYs Voy. p. 146, Taf. 38, Fig. 24	—
	v. MARTENS 1867, Ostas. Landschn. p. 166	? Java [JAGOR]
	WAGNER in MARTINI-CHEMNITZ, *Helic.* p. 145, Taf. 27, Fig. 11—14	—

Helicina (Geophorus) oxytropis		
v. *jagori*	PFEIFFER 1865, Monogr. Pneumonop. Suppl. II, p. 243	Java
	WAGNER in MARTINI-CHEMNITZ, *Helicina* p. 147, Taf. 27, Fig. 21 bis 24	—
Pythia		
pantherina.....	ADAMS 1850, Proc. Zool. Soc. p. 152	—
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 136	Anjer (Sundast.) [v. MARTENS]; Res. Bantam (Südwestküste) [v. HASSELT]
(= *pyramidata*) .	KÜSTER (nec REEVE) in MARTINI-CHEMNITZ, Auricul. p. 62, Taf. 9, Fig. 3, 4	—
	MOUSSON 1849, Moll. Java, p. 49, Taf. 5, Fig. 10	Nusa Baron [ZOLLINGER]
plicata	FÉRUSSAC, Prodrom. p. 101	
	KÜSTER in MARTINI-CHEMNITZ, Auricul. p. 9, Taf. 1, Fig. 34	—
	REEVE, Iconogr. Fig. 28	—
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 131	Surabaja [v. MARTENS]
undata.....	LESSON 1830, Voyage Coquille Zool. II, p. 336, Taf. 10, Fig. 6	—
	KÜSTER in MARTINI-CHEMNITZ, Auricul. p. 62, Taf. 9, Fig. 3, 4	—
	REEVE, Iconogr. Fig. 17	Madura bei Java
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 139	—
Cassidula auris-felis (= *coffea* CHEMNITZ)	BRUGUIÈRE 1792, Encyclop. meth. Vers. I, p. 343, Taf. 460, Fig. 5	—
	KOBELT in MARTINI-CHEMNITZ, Auricul. p. 181, Taf. 21, Fig. 16 bis 18	—
	PFEIFFER 1847, Proc. Zool. Soc. p. 179	Java [HEUSINGER]
	TAPPARONE-CANEFRI, Zool. Magenta p. 106	Java
	BOETTGER 1890, Ber. Senckenb. Ges. p. 165	Tandjong Priok bei Batavia [STRUBELL]
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 141, Taf. 8, Fig. 12—14	Surabaja [v. MARTENS]
faba	MENKE 1853, Zeitschr. Malak. p. 124	Java [HEUSINGER]
	KOBELT in MARTINI-CHEMNITZ, Auricul. p. 176, Taf. 21, Fig 8	—
mustelina.....	DESHAYES 1830, Encyclop. meth. Vers. II, p. 92	—

Cassidula		
mustelina	TAPPARONE-CANEFRI, Zool. Magenta p. 106	Java
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 144, Taf. 8, Fig. 15	Nusa Kembangan (Insel an der Südküste)
	KOBELT in MARTINI-CHEMNITZ, Auricul. p. 176, Taf. 21, Fig. 8	—
sulculosa	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 45, Taf. 5, Fig. 8	Bai von Pampang (Banjuwangi) [ZOLLINGER]
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV. p. 146, Taf. 8, Fig. 17	—
	KOBELT in MARTINI-CHEMNITZ, Auricul. p. 146, Taf. 8, Fig. 17	—
Plecotrema		
imperforatum	ADAMS 1853, Proc. Zool. Soc. p. 120	-
	PFEIFFER, Monogr. Auricul. p. 106	—
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 149	Madura [Koll. MOUSSON]
Auricula		
auris-judae	LINNÉ 1758, System. Nat. Ed. X, p. 728	-
	TAPPARONE-CANEFRI, Zool. Magenta p. 104	Murera (Java)
	BOETTGER 1891, Ber. Senckenb. Ges. p. 244	Tandjong Priok [STRUBELL]
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 154, Taf. 8, Fig. 6—11	Madura [Koll. MOUSSON]
	KOBELT in MARTINI-CHEMNITZ, Auricul. p. 83, Taf. 11, Fig. 3,4; Taf. 12, Fig. 1, 2	
auris-midae	LINNÉ 1758, System. Natur. Ed. X, p. 728	—
	KÜSTER in MARTINI-CHEMNITZ, Auricul. p. 12, 68, Taf. 2, Fig. 1—3	—
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 151	Batavia [GRUNER in Koll. DUNKER]; Java [Mus. Leyden]
märchi	MENKE 1853, Zeitschr. Malak. p. 124	Java (?)
	PFEIFFER, Novitates I, p. 3, Taf. 2, Fig. 1, 2	—
	KOBELT in MARTINI-CHEMNITZ, Auricul. p. 81, Taf, 10, Fig. 6, 7	—
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 153	vielleicht Java
Melampus		
fasciatus	DESHAYES 1830, Encyclop. meth. Vers. II, p. 90	—
	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 46, Taf. 5. Fig. 7	aus dem Tjiringhin [ZOLLINGER]
	KOBELT in MARTINI-CHEMNITZ, Auricul. p. 255, Taf. 39, Fig. 14 bis 18	—

Melampus		
fasciatus	v. Martens 1897 in Weber, Ergebn. IV, p. 161	Java [v. Hasselt und Mus. Berol.]; Anjer [v. Martens]
granifer	Mousson 1849, Moll. Java, p. 46, Taf. 5, Fig. 9; Taf. 20, Fig. 7	Bai von Pampang (Banjuwangi) [Zollinger]
	Kobelt in Martini-Chemnitz, Auricul. p. 215, Taf. 25, Fig. 13, 14	—
	v. Martens 1897 in Weber, Ergebn. IV, p. 166	—
luteus	Quoy et Gaimard, Voy. Astrol. Zool. II, p. 163, Taf. 13, Fig. 25—27	
	Mousson 1849, Moll. Java p. 47, Taf. 5, Fig. 5, 6	Nusa Baron [Zollinger]
	Küster in Martini-Chemnitz, Auricul. p. 39, Taf. 6, Fig. 1—3	
	v. Martens 1897 in Weber, Ergebn. IV, p. 163	Südküste [v. Richthofen]
Lymnaea		
javanica	Mousson 1849, Moll. Java, p. 42, Taf. 5, Fig. 1 (= *succineus* var.)	aus dem Tjiringhin
	v. Martens 1867, Malak. Blätter XV, p. 222—225 und Conchol. Mitth. I, p. 87—91, Taf. 16	
	v. Martens 1897 in Weber, Ergebn. IV, p. 3, Taf. 1, Fig. 3—7; Taf. 12, Fig. 2. 4	—
	Schepman 1912, Proc. mal. Soc. X, p. 235	Tuntang-River
v. *angustior*	v. Martens 1881, Conchol. Mitth. I, p. 88, Fig. 8	Batavia, Tjisurupan [v. Martens]
(= *rubiginosa*, Mich.)	v. Martens 1897 in Weber, Ergebn. IV, p. 4, Fig. 7	Sinagar
v. *costulata*	v. Martens 1897 in Weber, Ergebn. IV, p. 3, Taf. I, Fig. 3, 4	Tjipanas
v. *gibberula*	v. Martens 1867, Malak. Blätter XV, p. 225	bei Malang (östl. Java)
v. *intumescens*	v. Martens 1867, Malak. Blätter XV, p. 223 und Conchol. Mitth. I, p. 88, Fig. 2—4	Surabaja und Passuruan [v. Martens]; bei Rogodjampi (Banjumas) [Zollinger]
	Boettger 1890, Ber. Senckenb. Ges. p. 150	Buitenzorg und Sawah bei B.
	diese Arbeit p. 216	Depok, Buitenzorg, Tjitajam, Tjibodas
v. *longula*	Mousson 1849, Moll. Java p. 43, Taf. 5, Fig. 2, 3	aus dem Tjiringhin

Lymnaea javanica		
v. *longula*	v. MARTENS 1867, Malak. Blätter XV, p. 225	Tjikoya u. Gadok [ZOLLINGER]
	BOETTGER 1890, Ber. Senckenb. Ges. p. 150	Buitenzorg
	BOETTGER 1891, Ber. Senckenb. Ges. p. 244	Buitenzorg, Tjilewung (Westjava)
v. *obesa*	v. MARTENS 1867, Malak. Blätter XV, p. 223 und Conchol. Mitth. I, p. 87, Fig. 1	im See Telaga Patengan (Preanger) [v. RICHTHOFEN]
v. *porrecta*	v. MARTENS 1881, Conchol. Mitth. I, p. 89, Fig. 9, 10	—
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 5	Buitenzorg
v. *spirulata*	(MOUSSON in litt.) v. MARTENS 1867, Malak. Blätter p. 225	bei Buitenzorg [ZOLLINGER]
v. *subteres*	v. MARTENS 1881, Conchol. Mitth. I, p. 88, Taf. 16, Fig. 6, 7	—
(= *oliva* v. MARTENS)	BOETTGER 1891, Ber. Senckenb. Ges. p. 244	Bandong
v. *ventrosa*	v. MARTENS 1881, Conchol. Mitth. I, p. 88, Fig. 6, 7	Surabaja [v. MARTENS]
	v. MARTENS 1897 in WEBER. Ergebn. IV, p. 4	Tjipanas bei Buitenzorg
Planorbis (Gyraulus) compressus	HUTTON 1834, Journ. asiat. Soc. Beng. III, p. 93	–
	v. MARTENS 1867, Malak. Blätter XV, p. 213	bei Batavia [v. MARTENS]
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 13, Taf. 1, Fig. 17 bis 22	Situ-Bagendit bei Garut (Preanger) [WEBER]
	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 44, Taf. 5, Fig. 4 (= *tondanensis* QUOY et GAIMARD)	Java [ZOLLINGER]
	diese Arbeit p. 216	Buitenzorg, Tjitajam
infralineatus	v. MARTENS 1867, Malak. Blätter XV, p. 213	Telaga-Patengan (Preanger) [v. RICHTHOFEN]
	BOETTGER 1891, Ber. Senckenb. Ges. p. 245.	Tjilewung (Westjava) [STRUBELL]
Segmentina calathus	BENSON 1850, Ann. N. H. (2) V, p. 349	–
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 15	Buitenzorg [WEBER]

Ancylus		
javanus	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 15, Taf. 1, Fig. 35 bis 37	Buitenzorg [WEBER]
Melania		
(Balanocochlis)		
glandiformis ...	SCHEPMAN 1896, Notes Leyden Mus. XVIII, p. 136, Taf. 1, Fig. 2	Java [JUNGHUHN]
glans	v. D. BUSCH in PHILIPPI, Abbild. 1, p. 3, Taf. 1, Fig. 8	Java
	BROT in MARTINI-CHEMNITZ, Melan. p. 14, Taf. 1, Fig. 3	—
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 30	Palabuan [v. MARTENS]
pisum	BROT, Mater. II, p. 54, Taf. 2, Fig. 5	(?) Java [PETIT]
	BROT in MARTINI-CHEMNITZ, Melan. p. 18, Taf. 1, Fig. 7	—
(Sulcospira)		
angulifera	BROT, Mater. III, p. 32, Taf. 2, Fig. 4	Java [PETIT, ZOLLINGER]
	BROT in MARTINI-CHEMNITZ, Melan. p. 51, Taf. 6, Fig. 5	—
foeda	LEA 1850, Proc. Zool. Soc. p. 180	Java
	BROT in MARTINI-CHEMNITZ, Melan. p. 51, Taf. 6, Fig. 4	—
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 32, Taf. 2, Fig. 9, 10	Buitenzorg [WEBER]; Malangbong (Preanger) [JAGOR]
junghuhni	SCHEPMAN 1896, Notes Leyden Mus. XVIII, p. 135, Taf. 2, Fig. 1, 11	Java
sulcospira (= *spadicea* REEVE)	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 68, Taf. 9, Fig. 3	Java
	BROT in MARTINI-CHEMNITZ, Melan. p. 56, Taf. 6, Fig. 11	–
	BOETTGER 1891, Ber. Senckenb. Ges. p. 245	Buitenzorg
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 33	Tjipanas [WEBER]; Batavia und Malangbong [JAGOR]
testudinaria	v. D. BUSCH in PHILIPPI, Abbild. I, Taf. 1, Fig. 14	—
	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 66, Taf. 11, Fig. 1—3	in mehreren Flüssen des südl. Java
	BROT in MARTINI-CHEMNITZ, Melan. p. 49, Taf. 6, Fig. 3	—
	BOETTGER 1890, Ber. Senckenb. Ges. p. 151	bei Tjilewung und botanischer Garten in Buitenzorg, Südjava
	BOETTGER 1891, Ber. Senckenb. Ges. p. 245	Tandjong Priok (Westjava)

Melania		
(Sulcospira)		
testudinaria	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 31	See Situ-Bagendit bei Garut (Preanger); höhere Gegend im Preanger [v. HASSELT]; Malembong (= Malambong) [JAGOR]; Buitenzorg und Tjandjor [v. MARTENS]; im Flusse von Solo (Surakarta) und bei Djokjokarta (mittl. Java [v. MARTENS]; Surabaja und Passaruan (östl. Java) [v. MARTENS]; Samarang (Nordküste) [Koll. DUNKER]; Rogodjampi (Banjuwangi) [Koll. MOUSSON]
	SCHEPMAN 1912, Proc. mal. Soc. X, p. 236	Tuntang-River
	diese Arbeit p. 217	Buitenzorg
(Brotia)		
agrestis	REEVE, Conch. Icon. Fig. 140	-
	BROT in MARTINI-CHEMNITZ, Melan. p. 101, Taf. 13, Fig. 10	—
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 303 (Liste)	Java
infracostata	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 65, Taf. 10, Fig. 3	aus dem Tjiringhin
	BROT in MARTINI-CHEMNITZ, Melan. p. 98, Taf. 12, Fig. 3	—
subplicata	SCHEPMAN 1880 in VETH, Midden-Sumatra Mollusca p. 14, Taf. 1, Fig. 6	—
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 37, Taf. 2, Fig. 15	-
	diese Arbeit p. 218	Buitenzorg
torquata.....	v. D. BUSCH in PHILIPPI, Abbild. I, Taf. 1, Fig. 18	Java
	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 70, Taf. 9, Fig. 2; Taf. 22, Fig. 2	von der Mündung des Tjiringhin
	BROT in MARTINI-CHEMNITZ, Melan. p. 111, Taf. 14, Fig. 6	—
zollingeri	BROT, Mater. II, p. 42, Taf. 2, Fig. 4	Java [ZOLLINGER]
	BROT in MARTINI-CHEMNITZ, Melan. p. 111, Taf. 14, Fig. 6	—
(Stenomelania)		
acutissima	v.D.BUSCH 1858, Malak.Blätter p.33	—
	BROT in MARTINI-CHEMNITZ, Melan. p. 129, Taf. 16, Fig. 2	—
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 42, Taf. 3, Fig. 1, 2	Palabuan [FRUHSTORFER]

Melania (Stenomelania)		
anthracina	v. d. Busch in Philippi, Abbild. I, Taf. 3, Fig. 3	Java (?)
	Brot in Martini-Chemnitz, Melan. p. 127, Taf. 15, Fig. 10	—
arctecava	Mousson 1857, Journ. Conchyl. VI, p. 161	Badjumatil (östl. Java)
	Brot in Martini-Chemnitz, Melan. p. 165, Taf. 20, Fig. 1	—
crenulata	Deshayes in Lamarck, Anim. s. vert. 2. Bd., Nr. 17	—
	Brot in Martini-Chemnitz, Melan. p. 114, Taf. 14, Fig. 9	—
(= *porcata*) ...	Jonas 1844, Zeitschr. Malak. p. 50	—
	Mousson 1849, Moll. Java p. 69, Taf. 11, Fig. 4	Java
javanica	v. d. Busch in Philippi, II, p. 174	—
	Brot in Martini-Chemnitz, Melan. p. 246, Taf. 26, Fig. 7	—
	v. Martens 1897 in Weber, Ergebn. IV, p. 43	b. Tjipanas [Weber]; Sukabumi (Preanger) [Fruhstorfer]
coarctata	(Lamarck) Philippi, Abbild. II, p. 174, Taf. 4, Fig. 20	—
	Mousson 1849, Zeitschr. Malak. p. 182	—
monile	Mousson 1857, Journ. Conchyl, p. 162	(?) Java [Koll. Meder]
	Brot in Martini-Chemnitz, Melan. p. 173, Taf. 20, Fig. 7	—
mülleri	Schepman 1896, Notes Leyden Mus. XVIII, p. 138, Taf. 2, Fig. 5	Java
obesula	Brot in Martini-Chemnitz, Melan. p. 121, Taf. 15, Fig. 8	Java [Petit]
ornata	v. d. Busch in Philippi, Abbild. I, Taf. 1, Fig. 15, 16	Java
	v. Frauenfeld 1869 in Verh. zool.-bot. Ver. Wien p. 866	Java [wahrscheinlich Batavia, Novara-Expedition]
	Brot in Martini-Chemnitz, Melan. p. 173, Taf. 21, Fig. 2	—
plicaria	Born 1780, Testac. Mus. Caesar. Taf. 16, Fig. 14	—
	Brot in Martini-Chemnitz, Melan. p. 130, Taf. 16, Fig. 3 (= *hastula* Lea)	—
	v. Martens 1897 in Weber, Ergebn. IV, p. 41	(?) Java
rustica	Mousson 1857, Journ. Conchyl. VI, p. 160 (= *digitalis* Mousson ibid. juv.)	Banjuwangi im östl. Java [Zollinger]

Melania		
(Stenomelania)		
rustica	BROT in MARTINI-CHEMNITZ, Melan. p. 138, Taf. 17, Fig. 2	—
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 44	Bezuki [SENMELINK]; Rogodjampi in Banjuwangi [ZOLLINGER]
semicancellata . .	v. D. BUSCH in PHILIPPI, Abbild. I, Taf. 3, Fig. 2	Java
	BROT in MARTINI-CHEMNITZ, Melan. p. 118, Taf. 15, Fig. 1	—
semiornata	BROT 1860, Rev. Zool. Taf. 16, Fig. 5	Java [PETIT]
	BROT in MARTINI-CHEMNITZ, Melan. p. 159, Taf. 19, Fig. 10	—
subpunctata	SCHEPMAN 1896, Notes Leyden Mus. XVIII, p. 138, Taf. 2, Fig. 6	Java
terebriformis	BROT, Mater. I, p. 51	Java
	BROT in MARTINI-CHEMNITZ, Melan. p. 144, Taf. 18, Fig. 1	
(= *terebra*) . . .	v. D. BUSCH in PHILIPPI, Abbild. I, Taf. 1, Fig. 17	—
tristis	REEVE, Conch. Icon. Fig. 121	Java
	BROT in MARTINI-CHEMNITZ, Melan. p. 175, Taf. 21, Fig. 4	—
(Melanoides)		
crepidinata	REEVE, Conch. Icon. Fig. 120	Java [CUMING]
	BROT in MARTINI-CHEMNITZ, Melan. p. 238, Taf. 25, Fig. 13	—
cylindracea	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 72, Taf. 11, Fig. 9	Gegend von Pardana
	BROT in MARTINI-CHEMNITZ, Melan. p. 252, Taf. 26, Fig. 10	—
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 60	Buitenzorg [WEBER]
inhonesta	v. D. BUSCH in PHILIPPI, Abbild. I, Taf. 4, Fig. 5	(?) Java
	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 71	Malang
	BROT in MARTINI-CHEMNITZ, Melan. p. 206, Taf. 23, Fig. 8	—
parreyssii	BROT in MARTINI-CHEMNITZ, Melan. p. 254, Taf. 27, Fig. 5 (= *tuberculata* var.)	(?) Java [PARREYS]
tuberculata	MÜLLER 1774, Hist. verm. II, p. 191	—
	BROT in MARTINI-CHEMNITZ, Melan. p. 247, Taf. 26, Fig. 11	—
v. *malayana* . .	ISSEL 1874, Ann. Mus. Civico VI p. 463	—
	BROT in MARTINI-CHEMNITZ, Melan. p. 253, Taf. 16, Fig. 5	—

Melania		
(Melanoides)		
tuberculata		
v. *malayana* . .	BOETTGER 1890, Ber. Senckenb. Ges. p. 152	Botanischer Garten Buitenzorg [STRUBELL]; Kala-Tanabang bei Batavia
	BOETTGER 1891, Ber. Senckenb. Ges. p. 247	Tandjong Priok
v. *parreyssi* . .	BROT in MARTINI-CHEMNITZ, Melan. p. 254, Taf. 27, Fig. 5	Java [PARREYS]
	BOETTGER 1890, Ber. Senckenb. Ges. p. 152	Tjilewung bei Buitenzorg [STRUBELL]
v. *plicifera* . . .	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 73, Taf. 11, Fig. 7	Tjiringhin und Pardana
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 56	Buitenzorg
	diese Arbeit p. 218	Garoet, Buitenzorg
v. *seminuda* . .	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 58, Taf. 4, Fig. 1	bei Anjer und Sindang-laya (Preanger)
v. *truncatula* . .	LAMARCK 1822, Anim. s. vert. VI, Nr. 15	—
	BROT in MARTINI-CHEMNITZ, Melan. p. 250	
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 59	Blauw-water bei Passuruan [WEBER]
v. *virgulata* . . .	QUOY et GAIMARD, Voy. Astrol. Zool. III, p. 141, Taf. 56, Fig. 1 bis 4	—
	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 73, Taf. 11, Fig. 6	Tjiringhin und Pardana
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 57	Buitenzorg, Tjipanas [WEBER]; Surabaja [v. MARTENS]
unifasciata	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 70, Taf. 11, Fig. 8	Malang
	BROT in MARTINI-CHEMNITZ, Melan. p. 262, Taf. 28, Fig. 7	—
(Plotia)		
granum	v. D. BUSCH in PHILIPPI, Abbild. I, Taf. 1, Fig. 17	Java
	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 77, Taf. 12, Fig. 3	Gegend von Pardana
	BROT in MARTINI-CHEMNITZ, Melan. p. 270, Taf. 27, Fig. 12	—
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 65	Sumedang
(= *scabrella*) . .	MOUSSON (nec PHILIPPI) 1849, Moll. Java p. 77, Taf. 12, Fig. 2	aus dem Tirirsee
v. *buccinoidea* .	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 77, Taf. 12, Fig. 4	Gegend von Pardana
myurus	BROT 1860, Rev. Zool. Taf. 16, Fig. 3	Java [PETIT]

Melania		
(Plotia)		
myurus	BROT in MARTINI-CHEMNITZ, Melan. p. 271, Taf. 28, Fig. 1	—
savinieri	BROT 1886, Rev. Zool. Suisse IV, p. 93, Taf. 5, Fig. 9	Fluß Tanabang bei Batavia
scabra	MÜLLER 1774, Hist. Verm. II, p. 136	–
	BROT in MARTINI-CHEMNITZ, Melan. p. 266, Taf. 27, Fig. 14, 15	–
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 62	—
v. *angulifera*	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 64, Taf. 4, Fig. 8	Java
v. *mutica*	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 64, Taf. 4, Fig. 9—12	Buitenzorg, Tjipanas [WEBER]
	BROT in MARTINI-CHEMNITZ, Melan. Taf. 27, Fig. 14 c u. d	—
	SCHEPMAN 1912, Proc. mal. Soc. X, p. 237	Tuntang-River
v. *nodoso-costata*	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 76, Taf. 11, Fig. 11	aus dem Tirirsee
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 63, Taf. 4, Fig. 7	Situ-bagendit und Sinagar
v. *spinulosa*	LAMARCK 1822, Ann. s. Vert. VI, Nr. 12	– –
	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 76, Taf. 11, Fig. 12	Aus dem Tirirsee
	BOETTGER 1890, Ber. Senckenb. Ges. p. 153	Tjilewung bei Buitenzorg
	BOETTGER 1891, Ber. Senckenb. Ges. p. 248	Tandjong Priok
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 62, Taf. 4, Fig. 6	Java
(Melania s. str.*)*		
setifera	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 67	? Java [FRUHSTORFER]
(Tiaropsis)		
drilliiformis	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 305 (Liste)	Java
herklotsi	PETIT 1853, Journ. Conchyl. Taf. VII, Fig. 10	Java
	BROT in MARTINI-CHEMNITZ, Melan. p. 303, Taf. 31, Fig. 8	—
strigata	STRUBELL 1897, Nachrbl. 29, p. 11	Sokoboeni
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 316 (= *foeda* LEA)	—
winteri	v. D. BUSCH in PHILIPPI, Abbild. I, Taf. 1, Fig. 1, 2	Java

Melania		
(Tiasopsis)		
winteri	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 77, Taf. 12, Fig. 1	von Puger auf Java
	BROT in MARTINI-CHEMNITZ, Melan. p. 301, Taf. 31, Fig. 5	—
(Tarebia)		
asperula	BROT, Mater. II, Taf. 1, Fig. 11	Java
	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 74 Taf. 10, Fig. 7 (*semigranosa* V. D. BUSCH)	auf Java gemein
	BROT in MARTINI-CHEMNITZ, Melan. p. 327, Taf. 33, Fig. 11	
	BOETTGER 1890, Ber. Senckenb. Ges. p. 153	Buitenzorg (Tjilewung)
coffea	PHILIPPI, Abbild. II, Taf. 2, Fig. 4	Java
	BROT in MARTINI-CHEMNITZ, Melan. p. 326, Taf. 33, Fig. 10	—
	BOETTGER 1890, Ber. Senckenb. Ges. p. 153	Tjilewung bei Buitenzorg
	BOETTGER 1891, Ber. Senckenb. Ges. p. 248	Botanischer Garten Buitenzorg; Tandjong Priok
crenifera	LEA 1850, Proc. Zool. Soc. p. 192	Java
	BROT in MARTINI-CHEMNITZ, Melan. p. 323, Taf. 33, Fig. 9	—
flarida	DUNKER in PHILIPPI, Abbild. I, p. 164, Taf. 3, Fig. 5	Java
	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 75, Taf. 10, Fig. 5	Java
	BROT in MARTINI-CHEMNITZ, Melan. p. 329 (= *lirata* BENSON)	
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 72	—
(?) *granifera*	LAMARCK 1822, Anim. s. vert. VI, Nr. 13	
	BROT in MARTINI-CHEMNITZ, Melan. p. 321, Taf. 33, Fig. 13	
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 305 (Liste)	Java
lineata	GRAY 1828 in WOOD, Index test. Suppl. Fig. 68	
	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 74, Taf. 10, Fig. 6	Gegend von Pardana
	BROT in MARTINI-CHEMNITZ, Melan. p. 328, Taf. 33, Fig. 6	
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 71	—

Melania		
(Tarebia)		
lineata	BOETTGER 1891, Ber. Senckenb. Ges. p. 248 (= *lirata* BENSON)	Tandjong Priok
v. *semigranosa*	V. D. BUSCH in PHILIPPI, Abbild. I, p. 2, Taf. 1, Fig. 13	Java
	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 75 (= *subgranosa*)	Gegend von Pardana
	V. FRAUENFELD 1869 in Verh. zool.-bot. Ver. Wien p. 866	Java (wahrscheinlich Batavia; Novara-Expedition)
	V. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 72	Situ-bagendit im Preanger; Palabuan
	diese Arbeit p. 219	Garoet
margaritata	V. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 305 (Liste)	Java
tjibodasensis	diese Arbeit p. 219	Tjibodas
(Sermyla)		
riquetii	GRATELOUP, Mém. plus. esp. Moll. Taf. III, Fig. 28	—
	BROT in MARTINI-CHEMNITZ, Melan. p. 333, Taf. 34, Fig. 6	—
	BOETTGER 1890, Ber. Senckenb. Ges. p. 154	Tandjong Priok
semicostata	PHILIPPI, Abbild. II, p. 171, Taf. 4, Fig. 2	Java
	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 76, Taf. 11, Fig. 10 (= *riquetii* nec GRATELOUP)	Java [PARREISS]
	BROT in MARTINI-CHEMNITZ, Melan. p. 308, Taf. 32, Fig. 3	—
	V. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 73	Surabaja [V. MARTENS]
subcancellata	BOETTGER 1890, Ber. Senckenb. Ges. p. 151	Tandjong Priok
	BOETTGER 1891, Ber. Senckenb. Ges. p. 246	Tandjong Priok
(Incert. sedis)		
aeruginosa	FULTON 1904, Journ. Malac. XI, p. 51	Soekaboemi
fortitudinis	FULTON 1904, Journ. Malac. XI, p. 52	Soekaboemi
varia	BULLEN 1904, Proc. mal. Soc. VI, p. 110, Taf. 6, Fig. 1, 2	Java
Faunus		
ater	LINNÉ 1758, System. Natur. Ed. X, p. 746	—
	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 63, Taf. 10, Fig. 1	aus dem Flusse Tjimarra

Faunus		
ater	BROT in MARTINI-CHEMNITZ, Melan. p. 410, Taf. 44, Fig. 3	—
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 191	—
Potamides		
palustris	LINNÉ 1758, System. Natur. Ed. XII, p. 1213	—
	REEVE, Conch. Icon. XV, Fig. 1	—
	v. FRAUENFELD 1869 in Verh. zool.-bot. Ver. Wien p. 866	Java [wahrscheinlich Batavia, Novara-Expedition]
	TAPPARONE-CANEFRI, Zool. Magenta p. 41	Tangerang
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 176, Taf. 9, Fig. 24, 25	—
sulcatus	BORN 1778, Mus. Caesar. Vindob. p. 324	—
	REEVE, Conch. Icon. XV, Fig. 3	—
	TAPPARONE-CANEFRI, Zool. Magenta p. 41	Batavia
telescopium	LINNÉ 1758, System. Natur. Ed. X, p. 760	—
(=*fuscus*, SCHUM.)	SOWERBY, Thesaurus II, p. 848, Taf. 185, Fig. 269	—
	TAPPARONE-CANEFRI, Zool. Magenta p. 42	Batavia
	BOETTGER 1890, Ber. Senckenb. Ges. p. 167	Tandjong Priok
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 180	—
cingulatus	GMELIN, System. Natur. Ed. XIII, p. 3561	—
(=*fluviatilis* POT. et MICH.)	REEVE, Conch. Icon. XV, Fig. 9	
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 183	bei Surabaja [v. MARTENS]; bei Banjuwangi im östl. Java [SEMMELINK]
	v. FRAUENFELD 1869 in Verh. zool.-bot. Ver. Wien p. 866	Java [wahrscheinlich Batavia, Novara-Expedition]
ornatus	ADAMS in REEVE, Conch. Icon. XV, Fig. 22	—
	SOWERBY, Thesaurus II, p. 887, Taf. 186, Fig. 277, 278	—
	BOETTGER 1890, Ber. Senckenb. Ges. p. 167	Tandjong Priok [STRUBELL]
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 189.	—
Canidia		
helena	(MEDFR in) PHILIPPI, Abbild. II, p. 170, Taf. 4, Fig. 4	Java

Canidia		
helena	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 64, Taf. 10, Fig. 2 *(Melanopsis)*	südl. Java
	TAPPARONE-CANEFRI, Zool. Magenta p. 47 *(Hemisinus)*	Batavia
	BOETTGER 1890, Ber. Senckenb. Ges. p. 165	Tjilewung bei Buitenzorg
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 75	See Situ-Bagendit bei Garut (Preanger-Res.) [WEBER]; Surabaja [v. MARTENS]; Malembong im Preanger [JAGOR]
	diese Arbeit p. 220	Buitenzorg
temminkiana	bei v. MARTENS 1897, Ergebn. IV, p. 306 (Liste)	Java
Vivipara		
chinensis	GRAY in GRIFFITH, Anim. Kingdom, Mollusca Taf. 1, Fig. 5	—
v. *richthofeni*	NEVILL 1877, Cat. Moll. Indian Museum Fasc. E p. 26	
	BOETTGER 1890, Ber. Senckenb. Ges. p. 154, Taf. 6, Fig. 5	Bandong
	BOETTGER 1891, Ber. Senckenb. Ges. p. 249	Bandong
costata	QUOY et GAIMARD 1832, Voy. Astrol. Zool. III, p. 170, Taf. 58, Fig. 1 bis 5	—
v. *laevior*	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 21, Taf. II, Fig. 5, 6	Sinagar [WEBER]; Gebirgssee Telaga Patengan (Preanger) [v. RICHTHOFEN]
gratiosa	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 302 (Liste)	Java
hortulana	KOBELT in MARTINI-CHEMNITZ, *Paludina* p. 262, Taf. 54, Fig. 9 und 10	Botan. Garten Buitenzorg
javanica	v. D. BUSCH 1844 in PHILIPPI, Abbild. I, Taf. 1, Fig. 11, 12	—
	v. FRAUENFELD 1869 in Verh. zool.-bot. Ver. Wien p. 868	Java [wahrscheinlich Batavia, Novara-Expedition]
	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 61, Taf. 8, Fig. 3, 4	Mündung des Tjiringhin
	BOETTGER 1890, Ber. Senckenb. Ges. p 155	in stehendem Wasser bei Sawah bei Buitenzorg; in der Buitenzorger Gegend allgemein verbreitet. Tümpel bei Bandong
	BOETTGER 1891, Ber. Senckenb. Ges. p. 249	aus dem Tjilewung bei Buitenzorg

Vivipara		
javanica	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 21	durch ganz Java häufig, Umgegend von Batavia, Sindanglaya [v. MARTENS]; bei Buitenzorg [SEMON]; Malembong (Preanger-Reg.) [JAGOR]; Djokjakarta am Ufer des Soloflusses bei Surakarta (mittl. Java), Surabaja u. Passuruan (östl. Java) [v. MARTENS]
	KOBELT in MARTINI-CHEMNITZ, *Paludina* p. 251, Taf. 52, Fig. 1 bis 7	—
	diese Arbeit p. 220	Buitenzorg, Garoet, Depok
v. *moussoni*	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 22	Buitenzorg und Situ-Bagendit unweit Garut im Preanger [WEBER]; Sumedang im Preanger
	KOBELT in MARTINI-CHEMNITZ, *Paludina* p. 256, Taf. 52, Fig. 10 und 11	
(= *angularis*) .	(nec MÜLLER) MOUSSON 1849, Moll. Java p. 62, Taf. 8, Fig. 5	Tjiringin [ZOLLINGER]
v. *rouyeri*	BULLEN 1904, Proc. mal. Soc. VI, p. 110, Taf. 6, Fig. 3	auf Java
	KOBELT in MARTINI-CHEMNITZ, *Paludina* p. 258, Taf. 53, Fig. 5	
v. *scalaris*	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 61, Taf. 8, Fig. 4	
	KOBELT in MARTINI-CHEMNITZ, *Paludina* p. 257, Taf. 53, Fig. 1, 2; Taf. 55, Fig. 8, 9	Passuruan [Koll. v. MOELLENDORFF]
richthofeni	(v. MARTENS Mskr.) KOBELT in MARTINI-CHEMNITZ, *Paludina* p. 262, Taf. 54, Fig. 9, 10	auf Java
Bithynia		
truncata	EYDOUX und SOULEYET, Bonite, Zoolog. II, p. 548, Taf. 32, Fig. 22 bis 24	
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 25, Taf. 9, Fig. 11	See von Grati bei Passuruan und bei Malang
Stenothyra		
moussoni	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 210, Taf. 9, Fig. 7	Surabaja an der Mündung des Kediriflusses [v. MARTENS]; Malang (Res. Passuruan) [ZOLLINGER]
(Paludina)		
ventricosa	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 63, Taf. 8, Fig. 6	Lagunen des südl. Java [ZOLLINGER]

Ampullaria		
ampullacea	LINNÉ 1758, System. Natur. Ed. X	—
	KOBELT in MARTINI-CHEMNITZ, *Ampullaria* p. 76, Taf. 19, Fig. 1 bis 4; Taf. 21, Fig. 1	—
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 17	—
(= *celebensis*) ...	bei MOUSSON 1849, Moll. Java p. 59, Taf. 9, Fig. 1	bei Pardana
v. *magnifica*	PHILIPPI in MARTINI-CHEMNITZ, *Ampullaria* p. 64, Taf. 21, Fig. 1	—
	BOETTGER 1890, Ber. Senckenb. Ges. p. 155	Buitenzorg
conica	GRAY 1828 in WOOD, Index test. Suppl., *Helic.* Nr. 22	Java
	KOBELT in MARTINI-CHEMNITZ, *Ampullaria* p. 93, Taf. 40, Fig. 1 bis 5, 8, 9 (ist mit *scutata* MOUSSON identisch)	Java
javanica	REEVE, Conch. Icon. Taf. 20, Fig. 96	Java
	KOBELT in MARTINI-CHEMNITZ, *Ampullaria* p. 83, Taf. 35, Fig. 6	—
	BOETTGER 1890, Ber. Senckenb. Ges. p. 156 (= *conica* var.)	Buitenzorg [STRUBELL]
v. *fruhstorferi* ..	KOBELT in MARTINI-CHEMNITZ, *Ampullaria* p. 90, Taf. 38, Fig. 6 und 7	Tengergeb. (Ostjava) 800 Fuß; Sukabumi 2000 Fuß [FRUHSTORFER]
polita	DESHAYES 1830, Encyclop. Method. Vers. II, p. 31, Nr. 8	—
	KOBELT in MARTINI-CHEMNITZ, *Ampullaria* p. 82, Taf. 38, Fig. 1 bis 5	? Java
scutata	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 60, Taf. 8, Fig. 2	von Pardana
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 18	Buitenzorg [WEBER, SEMON]
	SCHEPMAN 1912, Proc. mal. Soc. X, p. 236	Djocja
	diese Arbeit p. 221 (vgl. *conica* GRAY)	Buitenzorg
turbinis	LEA 1856, Proc. Ac. Philad. VIII, p. 110	—
v. *subglobosa* ...	NEVILL, Handlist. Indian. Mus. II, p. 6	? Java [v. RICHTHOFEN]
Neritina		
bruguierei	RECLUZ 1841, Rev. Zool. p. 274	—

Neritina		
bruguierei	v. MARTENS in MARTINI-CHEMNITZ, *Neritina* p. 59, Taf. 9, Fig. 11—13	–
	v. MARTENS in WEBER, Ergebn. IV, p. 306 (Liste)	Java
communis	QUOY et GAIMARD, Astrolabe Zool. III, p. 195, Taf. 65, Fig. 12	—
	? MOUSSON 1849, Moll. Java p. 80, Taf. 12, Fig. 7	Java
	v. MARTENS in MARTINI-CHEMNITZ, *Neritina* p. 113, Taf. 11, Fig. 6, 7, 9	—
cornea	LINNÉ 1758, System. Natur. Ed. X, p. 777	—
	v. MARTENS in MARTINI-CHEMNITZ, *Neritina* p. 140, Taf. 12, Fig. 14 bis 18	Südküste von Java [JAGOR]
crepidularia	LAMARCK 1822, Anim. s. vert. Bd. VI, p. 186	—
	v. MARTENS in MARTINI-CHEMNITZ, *Neritina* p. 37, Taf. 7, Fig. 1—14	Java [Koll. MOUSSON, JAGOR]
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 218	–
dubia	CHEMNITZ 1781, Conchylien-Cabinet V, p. 324, Taf. 124, Fig. 2019 und 2020	–
	v. MARTENS in MARTINI-CHEMNITZ, *Neritina* p. 136, Taf. 12, Fig. 1—7	—
(= *bella*)	v. d. BUSCH in PHILIPPI, Abbild. I, p. 27, Taf. 1, Fig. 8	Java
	BOETTGER 1890, Ber. Senckenb. Ges. p. 162	Tandjong Priok
iris	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 81, Taf. 12, Fig. 10	Java
	v. MARTENS in MARTINI-CHEMNITZ, *Neritina* p. 52, Taf. 9, Fig. 5, 6	–
	BOETTGER 1891, Ber. Senckenb. Ges. p. 248	bei den Tausend Inseln von Westjava
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 77	—
pulligera	LINNÉ, System. natur. Ed. XII, p. 1253	—
	v. MARTENS in MARTINI-CHEMNITZ, *Neritina* p. 49, Taf. 1, Fig. 4, 5	Java [JUNGHUHN, JAGOR]
	BOETTGER 1890, Ber. Senckenb. Ges. p. 162	Batavia [STRUBELL]
turrita	CHEMNITZ 1786, Conchylien-Cabinet IX, 2, p. 71, Taf. 124, Fig. 1085	—
(= *semiconica*) ..	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 80, Taf. 12, Fig. 11	Java

Neritina		
turrita		
(= *semiconica*) . .	v. MARTENS in MARTINI-CHEMNITZ, *Neritina* p. 105, Taf. 11, Fig. 18 bis 23	Java [KUHL, v. HASSELT]; Nusa Kambangan [JAGOR]
variegata	LESSON 1830, Coquille Zool. II, p. 378	—
	v. MARTENS in MARTINI-CHEMNITZ, *Neritina* p. 98, Taf. 10, Fig. 11 bis 17	Anjer [v. MARTENS]; Java [JUNGHUHN]
	BOETTGER 1891, Ber. Senckenb. Ges. p. 248	Tandjong Priok
zigzag	(LAMARCK) SOWERBY, Thesaurus II, p. 540, Taf. 112, Fig. 105, 106	—
	v. MARTENS in MARTINI-CHEMNITZ, *Neritina* p. 101, Taf. 10, Fig. 20 bis 24	Java [KUHL, v. HASSELT]; Anjer [v. MARTENS]
Clithon		
brevispina	LAMARCK 1822, Anim. s. vert. VI, 2, p. 185	—
(= *corona australis*)	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 83, Taf. 12, Fig. 12; Taf. 20, Fig. 11	? Java
	v. MARTENS in MARTINI-CHEMNITZ, *Neritina* p. 156, Taf. 17, Fig. 1 bis 4, 9	aus dem Bomofluß (Banjuwangi) [Koll. MOUSSON]
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 79	—
	SCHEPMAN 1912, Proc. mal. Soc. X, p. 238	Nusa Kambangan
diadema	RECLUZ 1841, Rev. Zool. p. 277	—
	v. MARTENS in MARTINI-CHEMNITZ, *Neritina* p. 154, Taf. 15, Fig. 22 bis 26	—
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 307 (Liste)	Java
faba	SOWERBY, Conchol. Illustr. 38, Fig. 10	
	SOWERBY, Thesaurus II, p. 530, Taf. 115, Fig. 220, 221	
	v. MARTENS in MARTINI-CHEMNITZ, *Neritina* p. 176, Taf. 18, Fig. 14 bis 17	—
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 307, Taf. 10, Fig. 11	Java
flavovirens	v. D. BUSCH in PHILIPPI, Abbild. I, p. 26, Taf. 1, Fig. 23	Java
	v. MARTENS in MARTINI-CHEMNITZ, *Neritina* p. 184, Taf. 19, Fig. 1, 2	—

Clithon		
flavovirens	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 81, Taf. 10, Fig. 12, 15, 16	—
(= *emergens*)	MOUSSON 1857, Journ. Conchyl. VI, p. 163	Java [Koll. MEDER]
fuliginosa	v. D. BUSCH 1843 in PHILIPPI, Abbild. I, p. 26, Taf. 1, Fig. 5	Java
	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 82, Taf. 12, Fig. 8	Java
	v. MARTENS in MARTINI-CHEMNITZ, *Neritina* p. 185, Taf. 19, Fig. 18 und 19	Batavia [ZOLLINGER]
olivacea	RECLUZ 1842, Proc. Zool. Soc. p. 172	
	v. MARTENS in MARTINI-CHEMNITZ, *Neritina* p. 183, Taf. 19, Fig. 5 bis 7; p. 283	Palabuan
squarrosa	RECLUZ 1842, Revue Zool. p. 173	—
	v. MARTENS in MARTINI-CHEMNITZ, *Neritina* p. 162, Taf. 16, Fig. 13 bis 18	Palabuan (Westjava) [v. MARTENS]; im Flusse Badjumati und Bomo (östl. Java) [Koll. MOUSSON]
ruida	MOUSSON 1857, Journ. Conchyl. VI, p. 162	Badjumati [ZOLLINGER]
subocellata	bei v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 307 (Liste)	Java
subpunctata	RECLUZ 1843, Proc. Zool. Soc. p. 199	—
(= *rugosa*)	v. D. BUSCH 1843 in PHILIPPI, Abbild. I, p. 26, Taf. 1, Fig. 4	Java [WINTER]
	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 82, Taf. 12, Fig. 9	Java [ZOLLINGER]
	v. MARTENS in MARTINI-CHEMNITZ, *Neritina* p. 179, Taf. 18, 19, Fig. 20, 22—24	bei Bomo (östl. Java) [Koll. MOUSSON]
malaniensis	LESSON 1830. Coquille Zool. II, p. 379	
(= *nubila*)	v. D. BUSCH in PHILIPPI, Abbild. I, p. 30, Taf. 1, Fig. 13	Java
	v. MARTENS in MARTINI-CHEMNITZ, *Neritina* p. 193, Taf. 20, Fig. 1 bis 24	Palabuan (Südküste) [v. MARTENS]
Septaria		
junghuhni	(HERKLOTS) v. MARTENS in MARTINI-CHEMNITZ, *Navicella* p. 23, Taf. 4, Fig. 13—15	Java [JUNGHUHN]
suborbicularis	SOWERBY, Catal. TANKERVILLE, p. X	

Septaria		
suborbicularis	v. MARTENS in MARTINI-CHEMNITZ, *Navicella* p. 31, Taf. 6, Fig. 5—14	Java [Mus. Leyden]; Palabuan [v. MARTENS]; Fluß Bomo (Banjuwangi)[Koll. MOUSSON]
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 84	—
subsp. *fuscatoradiata*	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 84	Java
tesselata	LAMARCK	—
v. *clypeolum*	RECLUZ 1842, Proc. Zool. Soc. p. 157	—
	v. MARTENS in MARTINI-CHEMNITZ, *Navicella* p. 37, Taf. 7; Fig. 8 bis 15	Java [Mus. Leyden]
v. *oblonga*	v. MARTENS in MARTINI-CHEMNITZ, *Navicella* p. 38, Taf. 8, Fig. 1—3	—
(= *maculifera*	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 85, Taf. 12, Fig. 13	Panimbangfluß (Bantan, westl. Java) [ZOLLINGER]
Pilsbryoconcha		
exilis	LEA 1839, Trans. Americ. philos. Soc. VI, p. 81, Taf. 22, Fig. 68	-
	v. MARTENS 1867, Malak. Blätter XIV, p. 12	Umgegend Batavias
	CLESSIN in MARTINI-CHEMNITZ, p. 171, Taf. 56, Fig. 6—8	—
	SIMPSON, Najaden in Proc. U. S. Nat. Mus. Vol. 22, p. 587	—
(= *polita*)	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 98, Taf. 19, Fig. 2, 3	Java
Nodularia		
contradens	LEA 1838, Trans. Americ. philos. Soc. VI, p. 75, Taf. 18, Fig. 58	—
	REEVE, Conch. Icon. XVI, Taf. 29 Fig. 149	—
	SIMPSON, Najaden in Proc. U. S. Nat. Mus. Vol. 22, p. 817	—
(= *javanus*)	LEA 1840, Proc. Amer. Phil. Soc. I, p. 285	—
	KÜSTER in MARTINI-CHEMNITZ, p. 138, Taf. 41, Fig. 3; Taf. 79, Fig. 4, 6	in Flüssen der Insel Java
	v. MARTENS 1867, Malak. Blätter XIV, p. 14	Java [v. D. BUSCH]
(= *exilis*)	DUNKER 1846, Zeitschr. Malak. III, p. 109	-
	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 92, Taf. 16, Fig. 3	Java [ZOLLINGER]
	v. MARTENS 1867, Malak. Blätter XIV, p. 14	-

Nodularia contradens (= *mutatus*)	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 92, Taf. 16, Fig. 1, 2	Gegend von Pardana und Tjikoya
	v. MARTENS 1867, Malak. Blätter XIV, p. 14	—
(= *mederianus*) .	KÜSTER in MARTINI-CHEMNITZ, p. 242, Taf. 80, Fig. 7	Java [Koll. v. d. BUSCH]
	v. MARTENS 1867, Malak. Blätter XIV, p. 14	—
orientalis	LEA 1840, Proc. Americ. philos. Soc. I, p. 285	Java
	KÜSTER in MARTINI-CHEMNITZ, p. 241, Taf. 80, Fig. 6	Java
	v. MARTENS 1867, Malak. Blätter XIV, p. 15	Surabaja und Modjokerta (östl. Java) [v. MARTENS]
	SIMPSON, Najaden in Proc. U. S. Nat. Mus. Vol. 22, p. 819	—
(= *productus*) ...	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 93, Taf. 17, Fig. 3—5	Gegend von Pardana; See von Segaran (Distr. Pobolingo)
(= *productior*) ..	LEA 1852, Synopsis p. 29	—
	v. MARTENS 1867, Malak. Blätter XIV, p. 16	—
Pseudodon vondembuschianus .	LEA 1840, Proc. Amerik. philos. Soc. I, p. 288	Java
	KÜSTER in MARTINI-CHEMNITZ, p. 295, Taf. 98, Fig. 3	Java
	v. MARTENS 1867, Malak. Blätter XIV, p. 13	Java
	SIMPSON, Najaden in Proc. U. S. Nat. Mus. Vol. 22, p. 836	—
(= *crispata*)	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 97, Taf. 18, Fig. 1, 2	Java
	v. MARTENS 1867, Malak. Blätter XIV, p. 13	Batavia [v. MARTENS]
zollingeri	MOUSSON 1849, Moll. Java, p. 96 Taf. 18, Fig. 1	Gegend von Tjikoya
	KÜSTER in MARTINI-CHEMNITZ, p. 294, Taf. 98, Fig. 1	—
Lamellidens evanescens	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 91, Taf. 10, Fig. 2	Java [ZOLLINGER]
	v. MARTENS 1867, Malak. Blätter XIV, p. 14	Surabaja [v. MARTENS]
Cyrena eximia	DUNKER 1852, Zeitschr. Malak. III, p. 51	Fluß Progo bei Magelang (Res Kediri)

Cyrena		
eximia	PFEIFFER, Novitates I, p. 88, Taf. 24	—
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 98	im Mangledickicht bei Menerdjaja auf Nusa-Kambangan [JAGOR]
	CLESSIN in MARTINI-CHEMNITZ, p. 235	—
expansa	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 89, Taf. 14	östl. Java
	CLESSIN in MARTINI-CHEMNITZ, p. 105, Taf. 15, Fig. 1, 2	—
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 95	—
impressa	DESHAYES, Katal. Vener. II, p. 249	Java [nach JUKES]
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 93	—
moussoni	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 94	Tjandjor und Tji-Kalong (Preanger) [FRUHSTORFER]
(= *ceylonica*) v. *major*	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 89, Taf. 13	Fluß Panimbang bei Pardana (Bantam) [ZOLLINGER]
simuosa.....	DESHAYES 1854, Proc. Zool. Soc. p. 18	im Flusse Panimbang
	CLESSIN in MARTINI-CHEMNITZ, p. 228, Taf. 45, Fig. 1	—
	TAPPARONE-CANEFRI, Magenta Zool. p. 134	Takerang, Fiume Marera
(= *cyprinoides*)..	QUOY et GAIMARD in REEVE, Icon. Fig. 24	—
Batissa		
javanica.....	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 88, Taf. 15, Fig. 1 (= *violacea* var. *jav.*)	aus dem Flusse Panimbang bei Pardana in großer Menge
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 103	Palabuan [FRUHSTORFER]
jayensis	LEA 1834, Obs. Univ. I, p. 220	Batavia (?)
	REEVE, Icon., Fig. 19	—
	CLESSIN in MARTINI-CHEMNITZ, p. 207, Taf. 33, Fig. 3, 4	—
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 102	Java [WINTER]
Corbicula		
ducalis	PRIME 1862, Boston Soc. Proc. VIII, p. 274	—
	CLESSIN in MARTINI-CHEMNITZ, p. 184, Taf. 32, Fig. 5, 6	—

Corbicula		
ducalis	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 114	Buitenzorg, Tjipanas und Situ-Bagendit [WEBER]; Buitenzorg [Koll. DUNKER]; Sindang-laya [v. MARTENS]; Sukabumi [FRUHSTORFER]
	SCHEPMAN 1912, Proc. mal. Soc. X, p. 238	Tuntang River
	diese Arbeit p. 222	Buitenzorg, Garoet
(= *fluminea*)	PHILIPPI (nec MÜLLER), Abbild. II, p. 76, Taf. 1, Fig. 3	Java
	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 87, Taf. 15, Fig. 3	Java, in allen Gebirgsbächen
	BOETTGER 1890, Ber. Senckenb. Ges. p. 163	Tjilewung bei Buitenzorg
gracilis	PRIME 1862, Journ. Conchyl. X, p. 389, Taf. 14, Fig. 7	Java
	CLESSIN in MARTINI-CHEMNITZ, p. 191, Taf. 38, Fig. 2	—
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 117	—
javanica	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 86, Taf. 15, Fig. 2 (= *orientalis* var. *jav.*)	Tjikoya
	CLESSIN in MARTINI-CHEMNITZ, p. 181, Taf. 31, Fig. 20	—
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 111	Tjipanas [v. MARTENS]; Sukabumi [FRUHSTORFER]
ovalina	DESHAYES in FRAUENFELD 1869, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien p. 883	Java [Koll. „Novara“]
pullata	PHILIPPI, Abbild. III, p. 110	—
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 117	—
(= *javana*)	CLESSIN in MARTINI-CHEMNITZ, p. 180, Taf. 31, Fig. 16, 17	Java
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 118	Surabaja [v. MARTENS]
pulchella	MOUSSON 1849, Moll. Java p. 88, Taf. 15, Fig. 4	Gegend v. Tjikoya [ZOLLINGER]
	CLESSIN in MARTINI-CHEMNITZ, p. 181, Taf. 3, Fig. 5	—
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 120	—
rivalis	v. D. BUSCH 1850 in PHILIPPI, Abbild. III, p. 110, Taf. 3, Fig. 5	Java
	CLESSIN in MARTINI-CHEMNITZ, p. 159, Taf. 27, Fig. 15	—

Corbicula		
rivalis	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 120, Taf. 7, Fig. 32 und 33	—
(= *compressa*)...	(MOUSSON in litt.) DESHAYES 1854, Brit. Mus. Katal. conchif. p. 287	Java
	CLESSIN in MARTINI-CHEMNITZ, p. 165, Taf. 29, Fig. 11, 12	—
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 120	—
subrostrata	BULLEN 1904, Proc. mal. Soc. London Vol. VI, p. 109, Taf. 6, Fig. 7—9	Java
sulcata	CLESSIN in MARTINI-CHEMNITZ, p. 188, Taf. 32, Fig. 17, 18	Java
	v. MARTENS 1897 in WEBER, Ergebn. IV, p. 116	Buitenzorg, Batavia und Surabaja [v. MARTENS]; Samarang [Koll. DUNKER]; durch die ganze Länge von Java verbreitet [v. MARTENS]

Literaturverzeichnis.

Boettger, Oskar. 1890. Ad. Strubells Konchylien aus Java I. In: Ber. Senckenb. Naturf. Ges. 1890 p. 137—173, Taf. 5 und 6.

— 1891. Ad. Strubells Konchylien aus Java II und von den Molukken. In: Ber. Senckenb. Naturf. Ges. 1891 p. 241—318, Taf. 3 und 4.

Brot, A. 1874. Die Melaniaceen *(Melanidae)*. In: Martini-Chemnitz: Systematisches Conchylien-Cabinet Bd. 1, Abt. 24. Nürnberg 1874.

Bullen, R. A. 1904. Descriptions of new species of non-marine shells from Java, and a new species of *Corbicula* from New South Wales. In: Proc. mal. Soc. London Vol. 6, p. 109—111, Taf. 6.

— 1905. On a new variety of *Planispira zebra* Pfeiffer from the Island of Gisser, and a new species of *Chloritis* from Java. In: Proc. mal. Soc. London Vol. 6, p. 191—192, Taf. 11. Vgl. Gude 1907 p. 228.

Collinge, W. E. 1899. On some land-mollusks from Java, with description of a new species. In: Ann. Mag. N. H. (7) Vol. 4, p. 397—403, Taf. 7 und 8.

— 1908. Description of a new species of slug of the genus *Atopos* from Java. In: Journ. of Conchol. Leeds Vol. 12, p. 118—119.

Fulton, H. 1896. A list of the species of *Amphidromus*, Albers, with critical notes and descriptions of some hitherto underscribed species and varieties. In: Ann. Mag. N. H. (6) Vol. 17, p. 66—94, 3 Taf.

— 1904. On some new species of *Melania* and *Jullienia* from Yunnan and Java. In: Journ. of. Malac. Vol. 11, p. 51—52, Taf. 4.

Gude, G. K. 1903. Descriptions of some new forms of helicoid landshells. In: Proc. mal. Soc. London Vol. 5, p. 262—266, Taf. 7.

— 1905. Description of nine new species of helicoid landshells. In: Journ. of Malac. Bd. 12, p. 11—14, 28, Taf. 3 und 4.

— 1907. A further contribution to our knowledge of the genus *Chloritis*, with descriptions of eleven new species. In: Proc. mal. Soc. London Vol. 7, p. 228—233, Taf. 21.

Kobelt, Wilhelm. 1902. *Cyclophoridae*. In: Das Tierreich, Lieferung 16. Berlin 1902.

— 1905. Die Familie der Heliceen. Fünfte Abteilung. In: Martini-Chemnitz, Systematisches Conchylien-Cabinet Bd. 1. Abt. 12. Nürnberg 1905.

— 1909. Die Gattung *Paludina* Lam. (*Viripara* Montfort) N. F. In: Martini-Chemnitz, Systematisches Conchylien-Cabinet Bd. 2, Abt. 21a. Nürnberg 1909.

— 1911 ff. Die Familie *Ampullariidae* N. F. In: Martini-Chemnitz, Systematisches Conchylien-Cabinet Bd. 1, Abt. 20. Nürnberg 1911 ff.

Martens, Eduard von. 1865. Über ostasiatische und neuholländische Paludinen. In: Malakozoolog. Blätter Bd. 12, p. 144—151.

— 1867. Über die ostasiatischen Limnaeaceen. In: Malakozoolog. Blätter Bd. 14, p. 211—227.

— 1867. Die Landschnecken. In: Die Preußische Expedition nach Ostasien, Zoologischer Teil Bd. 2. Berlin 1867.
— 1881. Conchologische Mitteilungen Bd. 1. Kassel 1881.
— 1891. Landschnecken des Indischen Archipels. In: MAX WEBER, Zoologische Ergebnisse einer Reise in Niederl. Ostindien Bd. 2, p. 209—264, Taf. 12—14.
— 1897. Süß- und Brackwassermollusken des Indischen Archipels. In: MAX WEBER, Zoologische Ergebnisse einer Reise in Niederl. Ostindien Bd. 4, p. 1—331, Taf. 1—12.
— 1898. Die Diagnosen dreier neuer Arten von Landschnecken aus Niederl. Indien. S. B. Ges. naturf. Freunde 1898, p. 160—161; auch enthalten in: Conchologische Miscellen III. Arch. für Naturg. Bd. 65, p. 27—48, 4 Taf.
MOELLENDORFF, O. F. VON. 1896. Landschnecken von Celebes. In: Nachrbl. D. malak. Ges. 1896 Vol. 28, p. 133—156.
— 1897. Neue Landschnecken von Java. In: Nachrbl. D. malak. Ges. Vol. 29, p. 57—72, 89—97.
MOUSSON, ALBERT. 1849. Die Land- und Süßwassermollusken von Java. Zürich 1849.
— 1857. Novitates Zollingerianae. In: Journ. de Conchyliologie Vol. 6 (2 Sér. Vol. 2), p. 154—164.
PFEIFFER, LOUIS. Monographia Heliceorum viventium Lipsiae. Vol. II, 1848; Vol. IV, 1859.
— Novitates conchologicae (Mollusca extramarina) Bd. 4, 1870—1876.
PHILIPPI, R. A. Abbildungen und Beschreibungen neuer oder wenig gekannter Conchylien. Cassel. Bd. 1, 1845; Bd. 2, 1847.
PILSBRY, H. A., siehe TRYON, GEORGE W.
SCHEPMAN, M. M. 1880. Mollusca in: VETH, Midden-Sumatra Bd. 4, pt. 3, 18 pp., Taf. 1—3.
— 1896. Descriptions of new *Melanidae*. In: Notes Leyden Museum Bd. 18, p. 135—139, 1 Taf.
— 1912. On a collection of land- and freshwater Mollusca from Java. In: Proc. mal. Soc. London Bd. 10, p. 229—239, Taf. 10.
SIMROTH, H. R. 1892. Über eine Reihe von *Vaginula*-Arten. Sitz.-Ber. Ges. Leipzig Bd. 18, p. 58—73; Nachtrag p. 84—86.
— 1893. Über einige *Parmarion*-Arten. In: WEBER, Zoologische Ergebnisse einer Reise in Niederl. Ostindien Bd. 3, p. 100—111, 2 Taf.
— 1897. Nacktschnecken aus dem malayischen Archipel. In: Abh. Senckenb. Naturf. Ges. Bd. 24, p. 131—144, Taf. 14.
— 1898. Über die Gattungen *Parmacochlea, Parmarion* und *Microparmarion*. In: Zoolog. Jahrb. (Abt. Syst.) Bd. 11, p. 151—172, Taf. 15.
SMITH, E. A. 1887. Descriptions of some new species of landshells from Sumatra, Java and Borneo. In: Ann. Mag. N. H. (5) Bd. 20, p. 130—133.
STRUBELL, BRUNO. 1897. Neue Süßwasser-Conchylien aus Sumatra und Java. In: Nachrbl. D. malak. Ges. Bd. 29, 1897, p. 8—12.
TRYON, GEORGE W. Manual of Conchology (2. Ser. *Pulmonata*), continued by HENRY A. PILSBRY, Philadelphia, Bd. 4: 1888; Bd. 8: 1892; Bd. 13: 1900; Bd. 18: 1906.
WIEGMANN, F. Land-Mollusken (Stylommatophoren): Zootomischer Teil. In: Abh. Senckenb. Naturf. Ges. Bd. 24, p. 287—557, 11 Taf.

II. Celebes.

Die vorliegende kleine Sammlung wurde von Herrn Dr. H. AHLBURG (Berlin) auf seiner geologischen Forschungsreise im nördlichen Celebes gesammelt und unserem Museum freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Sie stammt zum größten Teil aus dem innersten Winkel der Tominibucht. Leider liegen nur leere Schalen vor in zum Teil nicht besonders gutem Erhaltungszustand, aber da in jener Gegend bisher noch nicht konchyliologisch gesammelt wurde, ist die Ausbeute doch recht interessant. Sie zeigt, daß die Formen der Nordhalbinsel unverändert bis über die Stelle hinausreichen, wo die Richtung der Halbinsel aus der west-östlichen in die nord-südliche umbiegt. Es bilden aber zwei der neuen Formen (*Xesta ahlburgi* und *Cyclotus moutonensis*) Übergänge zwischen Formen der Nordhalbinsel und weiter südlich vorkommender Arten.

Besprechung der einzelnen Arten.

Xesta ahlburgi nov. spec.

Tafel. Fig. 15.

Schale glänzend, eng durchbohrt, gedrückt kreiselförmig, etwas aufgeblasen, verhältnismäßig festschalig, mit dichtstehenden regelmäßigen Streifen, die mitunter durch dunkle Tönung schärfer hervorgehoben werden. Gewinde breit kegelförmig, mit wenig vorstehendem Nabel; Naht schwach angedrückt mit fein gefältetem Saum, unter der Naht mit etwas stärker eingedrückten, kurzen, dichtstehenden Falten. 5 Windungen, schwach gewölbt, die ersten $1^1/_2$ glatt, hell hornfarben oder tief dunkelviolett. Letzter Umgang wenig aufgeblasen, an der Peripherie gut gerundet, unten etwas abgeflacht, vorn nicht herabsteigend. Mündung schief, ausgeschnitten elliptisch. Mundraum einfach, dünn aber fest; Ränder entfernt, etwas zusammenneigend, in keiner Weise verbunden. Außenrand gut gewölbt, Unterrand ziemlich gerade aufsteigend. Columellarrand am Ende ganz kurz in ein dreieckiges Blättchen umgebogen, das den Nabel offen läßt.

Färbung sehr veränderlich.

Form A. Einfarbig: bei erhaltener Cuticula grünlichgelb, im abgeriebenen Zustande weißlich-gelb; auf der Oberseite etwas dunkler, mit scharfer Grenze gegen die hellere Unterseite absetzend. Wirbel gleichfarbig oder tief dunkelviolett, dieses geht auf der dritten Windung allmählich in die Grundfarbe über, bleibt aber als schmales dunkles Nahtband bis fast zur Mündung erhalten. Die Mündung innen, soweit die dunklere Außenfärbung reicht, braun mit einer dunklen, ca. 1,3 mm breiten Binde an der Grenze oder aber die ganze obere Hälfte dunkel gefärbt; in seltenen Fällen das dunkle Band allein erhalten. Auf der Oberseite finden sich wie bei *wallacei* dunkle, unregelmäßig verteilte Flecken, die nur wenig auf die Unterseite übergreifen und in der Durchsicht als helle Stellen auffallen. Stets ohne dunklen Nabelfleck.

Form B. Oberseite der Schale hellbraun, Unterseite rein weiß mit dunklem Nabelfleck, beide Seiten getrennt durch ein schwarzes, 1 mm breites Band, das als Nahtband bis auf die oberen Windungen zu verfolgen ist. An dieses Band schließt sich unmittelbar unter der Naht auf der folgenden Windung ein schmales, ebenfalls 1 mm breites weißes Band an. Wirbel stets braun bis dunkelviolett. Verteilung der schwarzen Flecke wie bei Form A. Einige Anwuchsstreifen treten auf der Oberseite durch dunklere Färbung hervor. Bei einigen Stücken hat sich die dunkle Farbe des Nabelfleckes soweit ausgedehnt, daß das Weiß der Unterseite vollständig dadurch verdrängt ist und auch die Oberseite etwas dunkler gefärbt erscheint. Die Zeichnung kann bei manchen Stücken noch dadurch verwickelter werden, daß eine Reihe von grünen Bändern hinzutritt, und zwar ein Band auf der Mitte der braunen Oberseite, eines unmittelbar über dem schwarzen peripheren Band (mitunter verdoppelt) und eines unmittelbar unter dem peripheren Band, das auch mitunter doppelt auftritt. Dann folgen noch zwei weitere Bänder (an der Mündung gemessen ca. 2 mm breit) auf der weißen Unterseite.

Diese grünen Bänder kommen auch zusammen mit der Färbung der Form A bei zwei Stücken vom Bolanosee vor, das eine zeigt dazu noch das periphere schwarze Band.

Die vorliegende Art stimmt in der Form mit *nitida*, v. MOELLENDORFF gut überein, aber der Zeichnungstyp ist ein ganz anderer; ebenso sind bei unserer Art die schwarzen Flecke stets zahlreich vorhanden, die bei *nitida* als nur ganz vereinzelt vorkommend angegeben werden und meistens ganz fehlen. Von *wallacei* aus Südcelebes, mit der sie durch das Vorkommen der schwarzen Flecke übereinstimmt, unterscheidet sie sich durch die mehr kugelige Gestalt und andere Färbung.

Molon-pat bei Mouton (Tominibucht), Nordcelebes, 19. IV. 1909.

7 Stück, alle Form A.

Diam. maj. 32,7 mm; min. 27,3; alt. 23,8; alt. ap. 14,6; diam. ap. 19. Wind. 5.
.. „ 31,5 „ „ 26; „ 20; „ „ 14,6; „ „ 18. „ $4^3/_4$.
„ „ 30 „ „ 25,4; „ 22,3; „ „ 14,2; „ „ 17,4. .. 5.
„ „ 30,5 .. „ 26; „ 21,5; „ „ 13,7; „ „ 17,8. .. 5.
.. .. 30,7 .. .. 25,8; .. 23,5; .. .. 14,5; .. .. 17,2. .. 5.
.. .. 27,7 „ „ 23,6; „ 20; „ „ 14,2; „ „ 15,2. .. $4^1/_2$.
.. .. 26,5 .. .. 23; .. 18; .. .. 13,4; .. .. 14,6. .. 5.

Bolanosee (Wälder am Strande), Tominibucht, Nordcelebes, April 1909.

3 Stück: Form A.

Diam. maj. 31 mm; min. 25,2; alt. 23,8; alt. ap. 14; diam. ap. 17,3. Wind. 5.
.. .. 26,5 .. .. 23 „ 20; .. .. 13; .. .. 15,2. .. 5.
.. .. 25,9 .. .. 22 .. 18,2; .. .. 14,2; .. .. 14 .. $4^1/_2$.

2 Stück: Form A mit grünen Bändern.

Diam. maj. 27,3 mm; min. 22,8; alt. 19; alt. ap. 14,3; diam. ap. 15,3. Wind. 5.
.. .. 27 „ „ 22,6; „ 19,2; „ „ 13 „ „ 15,3. „ 5.

5 Stück: Form B.

Diam. maj. 31 mm; min. 26,5; alt. 23,4; alt. ap. 15; diam. ap. 17,8. Wind. $5^1/_2$.
.. .. 29,4 .. .. 25; .. 21; .. .. 13,7; .. .. 16. .. $5^1/_2$.
.. .. 29 „ „ 25,3; „ 22; „ „ 14,4; „ „ 16,5. „ $5^1/_2$.
.. „ 28 „ „ 23,5; „ 18; „ „ 13,5; „ „ 16. „ 5.
.. .. 27,2 .. .. 22,5; „ 16,6; .. .. 12,5; .. .. 15,8. .. 5.

1 Stück: Form B mit grünen Bändern.

Diam. maj. 30,7 mm; min. 25,7; alt. 22,5; alt. ap. 15,3; diam. ap. 17,6. Wind. 5.

Galompengo bei Mouton (Nordcelebes), Mai 1909.

7 Stück: Form A.

Diam. maj. 30,3 mm; min. 25,7; alt. 24; alt. ap. 14,3; diam. ap. 17. Wind. 5.
„ „ 29,3 „ „ 23,5; „ 19,6; „ „ 14,3; „ „ 16,5. „ $4^3/_4$.
„ .. 29 .. .. 24,2; .. 22,5; .. .. 13; „ .. 16,5. .. 5.
„ „ 29 „ „ 24; „ 20,5; „ „ 13,7; „ „ 16,4. „ 5.
„ „ 28,9 „ „ 24,3; „ 19; „ „ 12,3; „ „ 16,4. „ $5^1/_2$.
.. .. 28,3 .. .. 23,7; .. 20,2; .. .. 14; .. .. 15,5. .. 5.
„ „ 27,2 „ „ 22,3; „ 19,2; „ „ 13; „ „ 15,3. „ 5.

6 Stück: Form B.

Diam. maj. 29,7 mm; min. 25,4; alt. 22,6; alt. ap. 13,6; diam. ap. 18. Wind. $5^1/_2$.
.. „ 29 .. .. 24,1; „ 21; .. .. 13; „ .. 16,4. .. 5.
.. „ 28 „ „ 23,2; „ 20; „ „ 13; „ „ 16. „ 5.
.. .. 27,7 „ „ 23,8; „ 20; „ „ 14; „ „ 15,7. „ 5.
.. .. 27,7 .. .. 22,8; „ 18,5; .. .. 13,7; .. .. 15,7. .. $4^3/_4$.
.. .. 24,8 „ „ 23; „ 18,5; „ „ 13,5; „ „ 14,2. „ 5.

1 Stück: Form B mit dunkler Unterseite.
Diam. maj. 27 mm; min. 22,6; alt. 19,8; alt. ap. 14,1; diam. ap. 15,2. Wind. 5.

Xesta nitida, v. Moellendorff.

1896. *Nanina (Xesta) fulvizona*, Mousson var. *nitida*, v. Moellendorff: Nachrbl. D. malak. Ges. Bd. 28, p. 136 (Toli-Toli).
1899. „ „ *nitida*, P. et F. Sarasin: Material. Naturg. Celebes Bd. 2, p. 149, Taf. 18, Fig. 178—181.
1905. „ „ „ Kobelt in: Martini-Chemnitz, *Helicidae* Bd. 5, p. 952. Taf. 247, Fig. 3—6.

Ob *fulvizona* v. Martens 1872 hierher gehört als Synonym, wie bisher in der Literatur angegeben, ist mir sehr zweifelhaft.

Siagafluß bei Menelili (Inneres der Tominibucht), Nordcelebes. Juni 1909.

3 Stück.

Diam. maj. 33 mm; min. 27,7; alt. 21,5; alt. ap. 15; diam. ap. 19. Wind. 5½.
„ „ 34,4 „ „ 29,3; „ 23; „ „ 15; „ „ 20. „ 5½.
„ „ 36 „ „ 31,4; „ 28,3; „ „ 18; „ „ 21,5. „ 5½.

In Gestalt und Skulptur stimmen die vorliegenden Stücke mit der Beschreibung im Martini-Chemnitz gut überein. Färbung von Exemplar Nr. 1: Grundfarbe gelblichbraun, ein ca. 2 mm breites, dunkelviolettes Peripherieband, das in das schmalere, ganz fein weiß berandete Nahtband übergeht. Darunter liegt ein 4 mm breites, weißlichgelbes Band, an das sich wieder ein dunkelviolettes, 4½ mm breites Band anschließt, das nach innen mit etwas verwachsenem Rand in die Grundfarbe übergeht. Ein dunkler Nabelfleck fehlt. Bei Exemplar Nr. 2 ist die ganze Oberseite von dem peripheren Band an einfarbig dunkelviolett (nur an der Mündung und auf der ersten Windung schimmert die gelbe Grundfarbe etwas durch), ebenso ist auf der Unterseite die helle Grundfarbe um den Nabel herum dunkel überlaufen. Das dritte Stück ist stark abgeblichen, scheint aber in der Färbung mit Nr. 1 übereinzustimmen, nur fehlt die untere dunkle Binde.

Strand bei Taada (Inneres der Tominibucht). Nordcelebes. Juni 1909.

1 ganz abgeblichenes Stück, das aber sicher hierher gehört.

Diam. maj. 35,3 mm; min. 29,4; alt. 25,3; alt. ap. 16; diam. ap. 19. Wind. 5½.

Hemiplecta wichmanni, Sarasin.

1899. *Nanina (Hemiplecta) wichmanni*, P. et F. Sarasin: Material. Naturg. Celebes Bd. 2, p. 162, Taf. 20, Fig. 203.
1905. „ „ „ Kobelt in: Martini-Chemnitz, *Helicidae* Bd. 5, p. 968, Taf. 251, Fig. 6, 7.

Siagaflu ß bei Menelili (Inneres der Tominibucht), Nordcelebes, Juni 1909.

9 Stück.

Diam. maj. 52 mm; min. 42,4; alt. 39; alt. ap. 25,8; diam. ap. 30,5. Wind. 6.
.. „ 51,4 „ „ 42,3; „ 35; „ „ 24; „ „ 32. „ 6.
.. .. 49 .. .. 40,5; .. 34,6; .. .. 24; „ „ 30,3. „ 6.
„ „ 48,7 „ „ 40,5; .. 35,5; .. .. 25; .. „ 29,4. „ 6.
.. .. 48 .. .. 40,3; .. 31,5; .. .. 22; .. .. 28,5. .. 6.
.. .. 45,2 .. .. 40; .. 33,8; .. .. 22,8; .. .. 28,4. .. $5^3/_4$.
.. .. 44,6 .. .. 38,5; .. 36; .. .. 22,3; .. .. 26,5. .. 6.
.. .. 42,8 „ .. 36,5; .. 33,2; .. .. 21,4; .. „ 26,8. .. 6.
.. .. 42,4 „ „ 36,6; .. 34,7; .. „ 23; „ „ 24,2. „ 6.

Die vorliegenden Schalen sind durchgehends kleiner als die von SARASIN gefundenen aus Zentralcelebes, stimmen aber mit der Beschreibung genau überein. Die Höhe des Gewindes variiert ziemlich.

Strand bei Taada (Inneres der Tominibucht), Nordcelebes, Juni 1909.

1 Stück.

Diam. maj. 39,7 mm; min. 33,5; alt. 27,7; alt. ap. 18,3; diam. ap. 24. Wind. $5^1/_2$.

Trochomorpha (Nigritella) robusta, Sarasin.

1899. *Trochomorpha (Nigritella) robusta*, P. et F. SARASIN: Material. Naturg. Celebes Bd. 2, p. 174, Taf. 21, Fig. 214, 215.

Galompengo bei Mouton, Nordcelebes, Mai 1909.

1 Stück, genau mit der Beschreibung und mit Fig. 215 übereinstimmend.

Diam. maj. 23,2 mm; min. 21; alt. 12. Windungen 5.

Obba (Obba) papilla, Müller.

1774. *Helix papilla*, O. F. MÜLLER: Hist. verm. II, p. 100.
.. .. PFEIFFER: MARTINI-CHEMNITZ, *Helicidae* Bd. 1, p. 157, Taf. 21, Fig. 8, 9.
1867. „ „ V. MARTENS: Ostasiat. Landschnecken p. 292.
.. .. DOHRN in: MARTINI-CHEMNITZ, *Helicidae* Bd. 4, p. 601, Taf. 175, Fig. 11, 12.
1899. *Obba* „ P. et F. SARASIN: Material. Naturg. Celebes Bd. 2, p. 182, Taf. 22, Fig. 227, 228.

Bolanosee (Wälder am Strande), Tominibucht, Nordcelebes, April 1909.

1 Stück ausgewachsen, mit SARASIN Fig. 227 genau übereinstimmend.

Diam. maj. 26,7 mm; min. 21,3; alt. 21,2. Windungen $5^1/_2$.

Molon-pat bei Mouton (Tominibucht), Nordcelebes, April 1909.

1 Stück erwachsen, sehr hoch, bienenkorbartig. Die Querrunzelung hat die Form wenig gebogener, scharfer, stark vortretender Rippen angenommen.

Diam. maj. 28,5 mm; min. 24; alt. 25,4. Windungen $5^1/_2$.

1 Stück unausgewachsen mit scharfem Mundsaum und scharfer, stumpf gekielter Peripherie (dadurch viel flacher aussehend), mit durchgehendem, aber engem Nabel.

Diam. maj. 22,3 mm; min. 22; alt. 20,6. Windungen $4^1/_2$.

Galompengo bei Mouton, Nordcelebes, Mai 1909.

3 Stück wie Fig. 227 bei SARASIN. Die Runzeln auf der letzten Windung ebenfalls parallel und rippenartig.

Diam. maj.	29,5 mm;	min.	22,7;	alt.	22,5.	Windungen	$5^1/_2$.
„ „	28,5 „	„	22,6;	„	22,4.	„	$5^1/_2$.
„ „	26 „	„	21;	„	22,2.	„	$5^1/_2$.

Gorontalo (Signalberg), Nordcelebes, 6. III. 1909.

8 Stück erwachsen wie SARASIN Fig. 227. Die Skulptur ist bei allen die typische Runzelskulptur.

Diam. maj.	27 mm;	min.	21,3;	alt.	21.	Windungen	$5^1/_4$.
„ „	25,2 „	„	20,3;	„	20,4.	„	$5^1/_2$.
„ „	25 „	„	20,6;	„	22.	„	$5^1/_4$.
„ „	24,6 „	„	20,3;	„	18,3.	„	5.
„ „	24,5 „	„	20,1;	„	22.	„	$5^1/_2$.
„ „	24 „	„	20,3;	„	19.	„	5.
„ „	23,8 „	„	20,2;	„	19,3.	„	5.
„ „	23,8 „	„	19,3;	„	19,4.	„	5.

2 Stück unausgewachsen, mit scharfem Kiel an der Peripherie und engem Nabel.

Diam. maj.	18,2 mm;	min.	16,6;	alt.	13,2.	Windungen	4.
„ „	17,6 „	„	16,4;	„	11,8.	„	4.

Obba (Pseudobba) papilliformis, v. Moellendorff.

1896. *Camaena (Pseudobba) papilliformis*, v. MOELLENDORFF: Nachrbl. Bd. 28, p. 145 (Toli-Toli).

1899. *Obba papilliformis*, P. et F. SARASIN: Material. Naturg. Celebes Bd. 2, p. 184, Taf. 25, Fig. 256.

Siagafluß bei Menelili (Inneres der Tominibucht), Nordcelebes, Juni 1909.

1 Stück, gut erhalten. Farbe: dunkelbraun, aber ohne die hellen Bändchen, von denen die SARASINs sprechen. Die Höhe ist etwas geringer als bei den SARASINschen Stücken.

Diam. maj. 33 mm; min. 26,3; alt. 26,4. Windungen $5^1/_4$.

Obba listeri, Gray.

1825. *Corocolla listeri*, GRAY: Ann. of Philos. XXV (N. S. 9), p. 412.
Helix „ PFEIFFER: MARTINI-CHEMNITZ, *Helicidae* p. 208, Taf. 101, Fig. 8; 9.
1872. „ „ V. MARTENS: Malak. Blätter p. 170 (Gorontalo).
1890. *Obba* „ PILSBRY in: TRYON, Manual of Conch. Bd. 6, p. 218, Taf. 56, Fig. 59—66.
1891. „ „ P. et F. SARASIN: Material. Naturg. Celebes Bd. 2, p. 178, Taf. 22, Fig. 218—222.

Sämtliche Stücke, wie schon SARASIN angegeben, klein und ohne Zahn am Basalrand; zur Form *tominica*, SARASIN gehörig.

Bolanosee (Wälder am Strande). Tominibucht, Nordcelebes. April 1909.

1 Stück.

Diam. maj. 20,7 mm; min. 16,7; alt. 8,2. Windungen $3^1/_2$.

Strand bei Taada (Inneres der Tominibucht), Nordcelebes, Juni 1909.

2 Stücke, durch ihre flache Form einen Übergang zur Form *mongondica* bildend, doch ist das untere Band schon unterbrochen.

Diam. maj. 21,5 mm; min. 17,5; alt. 8,3. Windungen $4^1/_2$.
„ „ 20,4 „ „ 18; „ 9. „ $4^1/_4$.

Galompengo bei Mouton. Nordcelebes. Mai 1909.

2 Stück.

Diam. maj. 21,4 mm; min. 17,5; alt. 9. Windungen 4.
„ „ 21 „ „ 17; „ 9. „ 4.

Eulota suffodiens, Boettger.

1891. *Helix (Dorcasia) suffodiens*, BOETTGER: Ber. Senckenb. Naturf. Ges. p. 267, Taf. 3, Fig. 10.
1896. *Eulota suffodiens*, SMITH: Proc. mal. Soc. London Bd. 2, p. 102.
1899. „ „ P. et F. SARASIN: Material. Naturg. Celebes Bd. 2, p. 202 (Gorontalo).

Gorontalo (Signalberg), Nordcelebes, 6. III. 1909.

1 Stück, mit BOETTGERs Beschreibung und Figur gut übereinstimmend.

Diam. maj. 14 mm; min. 11,8; alt. 11,6; alt. ap. 7,7; diam. ap. 8,3. Wind. 5.

Amphidromus (Syndromus) sinistralis, Reeve.

1849. *Bulimus sinistralis*, REEVE: Conchol. Icon. Taf. 81, Fig. 603.
1867. „ „ V. MARTENS: Ostas. Landschn. p. 355, Taf. 21, Fig. 2, 11.
1884. „ „ TAPPARONE-CANEFRI: Ann. Mus. civic. Genua Bd. 20, p. 147, 169.
1891. *Amphidromus* „ BOETTGER: Ber. Senckenb. Naturf. Ges. 1891, p. 269.
1896. „ „ FULTON: Ann. Mag. N. H. (6) XVII, p. 76.
1898. „ „ KOBELT: Abh. Senckenb. Naturf. Ges. Bd. 24, p. 79, Taf. 8, Fig. 8.
1899. „ „ P. et F. SARASIN: Material. Naturg. Celebes, Bd. 2, p. 212, Taf. 26, Fig. 261.
1900. „ „ PILSBRY: Manual of Conch. Bd. 13, p. 232, Taf. 68, Fig. 23—31.

Bolanosee (Wälder am Strande). Tominibucht. Nordcelebes. April 1909.

4 Stück ausgewachsen, 1 Stück juv., alle sehr abgeblichen, doch bei allen hinter dem Mundrand ein dunkler Saum deutlich.

Diam. maj. 18,5 mm; min. 15,8; alt. 37,2; alt. apert. 18. Windungen 6.
.. .. 15,7 .. .. 14; .. 32,4; .. .. 15. .. 6.

Gorontalo (Signalberg), Nordcelebes, 6. III. 1909.

7 Stück, davon 3 verblichen; 3 gehören zu der var. *lutea*, PRESTON und 1 zur var. *fasciata*, SARASIN.

Diam. maj. 17,1 mm; min. 14,4; alt. 35,5; alt. apert. 15,3. Windungen 6.
.. .. 17 .. .. 15; .. 35,5; .. .. 16,5. .. 6.
.. .. 16,7 .. .. 16,4; .. 32; .. .. 11,3. .. $5^1/_2$.

Var. *lutea*, PRESTON; rein gelb, ohne jede Fleckenzeichnung, mit weißem Mundrand.
Diam. maj. 18,2 mm; min. 15,7; alt. 38,3; alt. apert. 17,2. Windungen 6.
.. .. 16,7 .. .. 16,6; .. 34,2; .. .. 15,5. .. 6.
.. .. 16,3 .. .. 13,8; .. 39,4; .. .. 17,3. .. 6[1]).

Var. *fasciata*, SARASIN; der KOBELTschen Fig. 8, Taf. 7, entsprechend, nur geht die Bänderung bis zur Mündung. Der letzte Umgang trägt deutliche dunkle Striemen; hinter dem Mundrand befindet sich ein dunkler Saum.

Diam. maj. 17 mm; min. 15; alt. 36,7; alt. apert. 16. Windungen $5^1/_2$.

Leptopoma moutonense nov. spec.

Tafel, Fig. 17.

Schale eng genabelt, getürmt-kegelförmig, ziemlich dünn, fein schräg gestreift, alabasterweiß. Apex spitz, 5 mäßig gewölbte Windungen, die fast bis zur Spitze mit wenig vortretenden feinen Spiralreifen besetzt sind. Letzter Umgang mit einer schwachen Kante, die nach der Mündung zu ganz verschwindet; beiderseits gut gewölbt, unten glatt. Mündung ziemlich schräg, fast kreisrund, innen weiß. Mundrand verdickt, fast doppelt, gut ausgebreitet (ca. 1,5 mm breit), allmählich ohne Ecke in den verschmälerten Spindelrand übergehend; an der Berührungsstelle mit dem Kiel etwas vorgezogen und mit einem schwachen Kanal versehen. Die beiden Mundränder durch einen Kallus verbunden.

Von *vitreum* durch das höhere Gewinde und den abweichenden Mundsaum verschieden; auch fehlen die für jene Art charakteristischen feinen Spirallinien. *L. menadense*, PFEIFFER hat einen viel stärkeren Kiel auf der letzten Windung und ein weniger hohes Gewinde, ebenso *moussoni*, V. MARTENS.

[1]) Ein auffallend schlankes Stück.

Galompengo bei Mouton (Nordcelebes), Mai 1909.

1 Stück.

Diam. maj. 12,3 mm; min. 10; alt. 14; alt. ap. 8,2; diam. ap. 7,8. Wind. 5.

Leptopoma celebesianum, v. Moellendorff.

1896. *Leptopoma celebesianum*, v. MOELLENDORFF: Nachrbl. D. malak. Ges. Bd. 28, p. 149.
1899. „ „ P. et F. SARASIN: Material. Naturg. Celebes Bd. 2, p. 20, Taf. 1, Fig. 9—11; Taf. 5, Fig. 51; Taf. 7, Fig. 78.
1902. „ „ KOBELT: Tierreich Lief. 16, *Cyclophoridae* p. 21.

Das vorliegende Exemplar stimmt mit den Abbildungen bei SARASIN gut überein. Bis zur dritten Windung sind deutliche Spiralreifen entwickelt, die von da ab undeutlich werden und feinen, dichtstehenden Spirallinien Platz machen. Die obersten Windungen sind einfarbig braun, die unteren mit vielen feinen braunen Flecken gezeichnet, die zum Teil noch ihre Herkunft aus aufgelösten, zickzackförmigen Querstreifen verraten und auf der letzten Windung mit der Peripherie scharf abschneiden. Die Unterseite der letzten Windung ist schmutzigweiß.

Bolanosee (Wälder am Strande), Tominibucht, Nordcelebes, April 1909.

1 Stück.

Diam. maj. 11 mm; min. 9; alt. 11; alt. apert. 6,5; diam. apert. 6,3. Wind. 5.

Bisher nur von Südcelebes (SARASIN, v. MOELLENDORFF) und von der Palosbucht (SARASIN) bekannt.

Cyclotus (Pseudocyclophorus) politus, Sowerby.

1843. *Cyclostomus politus*, SOWERBY: Thesaurus Conchyl. Bd. 1, p. 97, Taf. 23, Fig. 17.
1849. „ „ PFEIFFER: MARTINI-CHEMNITZ p. 155, Taf. 21, Fig. 13, 14.
1891. *Cyclotus* „ v. MARTENS in: WEBER, Ergebnisse Bd. 2, p. 212, Taf. 12, Fig. 4.
1899. „ „ P. et F. SARASIN: Material. Naturg. Celebes Bd. 2, p. 38, Taf. 2, Fig. 15—17.
1902. „ „ KOBELT: Tierreich Lief. 16 *(Cyclophoridae)*, p. 194.

Die vorliegenden Stücke stimmen mit den Figuren bei SARASIN, Taf. 2, Fig. 15 und 17, gut überein.

Bolanosee (Wälder am Strande), Tominibucht, Nordcelebes, April 1909.

9 Stück, sehr abgeblichen.

Diam. maj. 16,1 mm; min. 13,3; alt. 13,2. Windungen $4^1/_2$.
„ „ 16 „ „ 13,2; „ 13,2. „ $4^1/_2$.
„ „ 15,7 „ „ 13; „ 13,6. „ $4^1/_2$.

Strand bei Taada (Inneres der Tominibucht), Nordcelebes, Juni 1909.

1 Stück.

Diam. maj. 14,5 mm; min. 11,6; alt. 11,5. Windungen $4^1/_2$.

Galompengo bei Mouton, Nordcelebes, Mai 1909.

1 Stück, stark abgeblichen.

Diam. maj. 15,8 mm; min. 12,6; alt. 13. Windungen $4^1/_2$.

Cyclotus (Eucyclotus) moutonensis nov. spec.

Tafel, Fig. 16.

Gehäuse scheibenförmig, weit und durchgehend genabelt, festschalig, weißlichgelb mit netzförmig angeordneten braunen Flecken, die auf der zweiten und dritten Windung als braune Zickzackbinden angeordnet sind; die ersten $1^1/_2$ Windungen einfarbig. Gewinde leicht erhaben; 5 gewölbte, an der Naht abgeflachte, rasch zunehmende Windungen. Die 2 ersten Windungen glatt, die folgenden 3 mit deutlichen Spiralreifen (auf der vorletzten Windung 5, auf der letzten 7). Letzte Windung an der Peripherie schwach gekielt, unten mit ganz schwach angedeuteten Spiralstreifen, vorn herabsteigend. Mündung schräg, innen ungefärbt; Mundrand doppelt: innerer zusammenhängend, kurz vorspringend, oben angedrückt; äußerer wenig verdickt, mäßig ausgebreitet, an der Naht dreieckig verbreitert, angedrückt.

Von *pyrostoma*, SMITH durch die anders gefärbte Mündung, weniger verdickten Mundrand und kleinere Gestalt unterschieden; von *semiliratus*, v. MOELLENDORFF, dem die vorliegende Form am nächsten steht, durch etwas höheres Gewinde und engeren Nabel verschieden. *C. jellesmae*, SARASIN ist eine viel flachere Form. Die vorliegende Art bildet einen Übergang zwischen *C. jellesmae* und der nur im südlichen Celebes vorkommenden *C. pyrostoma* und *semiliratus*.

Galompengo bei Mouton (Nordcelebes), Mai 1909.

1 Stück.

Diam. maj. 19,2 mm; min. 16,1; alt. 13. Windungen 5.

Bolanosee (Wälder am Strande), Tominibucht, Nordcelebes, April 1909.

5 Stück.

Diam. maj. 18,5 mm; min. 15,5; alt. 11,5. Windungen 5.
„ „ 18 „ „ 14,3; „ 11 „ 5.
„ „ 17,5 „ „ 13,5; „ 10 „ 5.

Cyclotus (Eucyclotus) nigrospirus, P. et F. Sarasin.

1899. *Cyclotus (Cyclotus) nigrospirus*, P. et F. SARASIN: Material. Naturg. Celebes Bd. 2, p. 46, Taf. 2, Fig. 28; Taf. 3, Fig. 28.

Die vorliegenden Stücke stimmen mit der Beschreibung und Abbildung bei SARASIN gut überein, nur ist bei allen Stücken (soweit es sich bei dem ausgeblichenen Zustand der Schalen beurteilen läßt) das Innere der

Mündung nicht orangerot sondern weiß. Die Hammerschlagskulptur ist auf die letzte Windung beschränkt und der Apex zeigt die typische tiefdunkle, ausgedehnte Färbung.

Diese Form könnte, wenn sich die weiße Mündung bestätigt, einen Übergang zu *buginensis*, SARASIN, l. c. p. 47, vom Lurusee bilden.

Strand bei Taada, Inneres der Tominibucht, Nordcelebes, Juni 1909.

Süßwassermollusken.

Ampullaria (Pachylabra) ampullacea, Linné.

1758. *Helix ampullacea*, LINNÉ: System. nat. ed. XII, p. 1244; Mus. Ulric. p. 666 (ex parte).
1897. *Ampullaria ampullacea*, v. MARTENS in: WEBER, Ergebn. Niederl. Indien Bd. 4, p. 17.
1899. „ „ P. et F. SARASIN: Material. Naturg. Celebes Bd. 1, p. 68.
„ *celebensis*, QUOY et GAIMARD: Voyage Astrolabe Bd. 3, p. 167, Taf. 57, Fig. 1—4.
„ „ PHILIPPI in: MARTINI-CHEMNITZ, *Ampullacea* p. 39, Taf. 101, Fig. 3, 4.
1911. „ *ampullacea*, KOBELT in: MARTINI-CHEMNITZ, *Ampullacea* p. 76.

Bolanosee (Tominibucht), Nordcelebes, April 1909.

1 Stück, an der Spitze etwas korrodiert.

Diam. maj. 65 mm; min. 53,5; alt. 72; alt. ap. 54,5; diam. ap. 29. Wind. 5.

Ampullaria (Pachylabra) scutata, Mousson.

1849. *Ampullaria scutata*, MOUSSON: Moll. Java p. 60, Taf. 8, Fig. 2.
1897. „ „ v. MARTENS: WEBER, Ergebn. Niederl. Indien Bd. 4, p. 18.

Bolanosee (Wälder und Sümpfe), Tominibucht, Nordcelebes, April 1909.

1 Stück, an der Spitze etwas korrodiert.

Diam. maj. 32,8 mm; min. 28; alt. 36,7; alt. ap. 26,5; diam. ap. 15,5. Wind. 5.

Gorontalo (Signalberg), Nordcelebes, 6. III. 1009.

2 Stück.

Diam. maj. 29,4 mm; min. 25; alt. 33,3; alt. ap. 24,7; diam. ap. 14,5. Wind. $4^1/_2$ [1]).
„ „ 20,1 „ „ 17,2; „ 23,4; „ „ 19,2; „ „ 9,8. „ $4^1/_2$ [2]).

[1]) An der Spitze etwas angefressen.
[2]) Vollständig erhalten, aber jung.

Literatur.

Die vollständige Literatur über Celebes findet man verzeichnet bei:

SARASIN, P. et F. Materialien zur Naturgeschichte von Celebes. Bd. 1: Die Süßwassermollusken von Celebes. Wiesbaden. 1898. — Bd. 2: Die Landmollusken von Celebes. Wiesbaden. 1899.

Seitdem sind noch folgende Abhandlungen über Land- und Süßwassermollusken von Celebes erschienen:

1899. SYKES, E. R. Note on the *Clausiliae* of Celebes. In: Nautilus XIII, p. 86—87. [*Clausiliae bonthainensis,* SARASIN ist ein Synonym zu *pyrrha,* SYKES. 1897].

1899. SCHEPMAN, M. M. On a new variety of *Leptopoma manadense,* PFEIFFER. In: Notes from Leyden Museum Bd. 21, p. 31—32.

1902. GREDLER, VINCENZ. Zur Conchylienfauna von Borneo und Celebes. In: Nachrbl. D. malak. Ges. Bd. 34, p. 53—62.

1903. GUDE, G. K. A classified list of the helicoid Land shells of Asia, Part. VII F. Celebes. In: Journ. of Malacol. Bd. 10, p. 83—85.

1912. HAAS, FRITZ. New Land and Freshwater Shells collected by Dr. J. ELBERT in the Malay Archipelago. In: Ann. Mag. N. H. (8) Bd. 10, p. 412—420. [*Hemiplecta (Rhysota) rugulosa, Leptopoma celebesianum concolor, Melanoides crepidinatus ventricosulus* von Mengkoka, Südostcelebes; *Chloritis planorbina* von Roembia, Südostcelebes; *Hemiplecta rasori* von der Insel Moena am Südostende von Celebes; *Nanina trauti, Nanina butonensis hageni* und *rarimaculata, Tarebia celebensis boetonensis* von der Insel Boeton am Südostende von Celebes; *Pseudonenia simillima kabaense, Cyclotus diecoideus, Lagochilus tricarinatus, Melanoides striatissimus* von der Insel Kabaena am Südostende von Celebes.]

Tafelerklärung.

Seite

Fig. 1. *Kaliella platyconus,* V. MOELLENDORFF. 6 × vergrößert 208
„ 2. „ *acutiuscula,* V. MOELLENDORFF. 6 × vergrößert 208
„ 3. *Lamprocystis nana,* V. MOELLENDORFF. 6 × vergrößert 209
„ 4. „ spec. juv. 6 × vergrößert 209
„ 5, 6. *Plectotropis kraepelini* nov. spec. Natürl. Größe 211
„ 7. „ „ Teil der Oberseite, 7 × vergrößert.
„ 8—9. „ *conoidea* nov. spec. Natürl. Größe 212
„ 10. *Diplommatina hortulana* nov. spec. 4 × vergrößert 215
„ 11. „ „ Skulptur der Windungen. 15 × vergrößert.
„ 12. *Melania tjibodasensis* nov. spec. Natürl. Größe 219
„ 13. Laich von *Natica* spec. (TROMSOE), etwas vergrößert.
„ 14. Derselbe in natürl. Größe.
„ 15 a—c. *Xesta ahlburgi* nov. spec. 273
„ 16 a—c. *Cyclotus moutonensis* nov. spec. 282
„ 17. *Leptopoma moutonense* nov. spec. 280

Eingegangen am 1. November 1914.

Gedruckt bei Lütcke & Wulff, E. H. Senats Buchdruckern.

M. Leschke, Mollusken.
JAVA und CELEBES

Gedruckt bei Lütcke & Wulff, E. H. Senats Buchdruckern.

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES

3 9088 00567 5020